

## 药物与临床

口服卡培他滨治疗晚期恶性肿瘤57例

刘青青1, 钱媛2, 范柏林1, 白艳梅1, 肖敏1

华中科技大学同济医学院附属同济医院1.综合科; 2.护理部, 武汉430030

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的探讨口服卡培他滨治疗晚期恶性肿瘤的效果。方法57例晚期恶性肿瘤患者, 给予卡培他滨2 500 mg (m<sup>2</sup>)<sup>-1</sup> d<sup>-1</sup>, 早晚分两次餐后30 min内口服, 治疗两周后停药1周, 3周为一个疗程。结果治疗6~8个疗程后, 部分缓解17例, 稳定21例, 进展19例。总有效率29.82%, 临床受益率66.67%。治疗过程中出现手足综合征29例, 皮肤色素沉着28例, 厌食16例, 恶心、腹泻各13例, 呕吐11例。结论口服卡培他滨治疗晚期恶性肿瘤效果良好, 且用药方便, 不良反应较轻。

**关键词** [卡培他滨; 肿瘤, 恶性, 晚期; 治疗效果; 不良反应](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2012\) 05-0615-02](#)

通讯作者:

## 扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1080KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\] \(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献 \[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“卡培他滨; 肿瘤, 恶性, 晚期; 治疗效果; 不良反应” 的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [刘青青](#)
- [钱媛](#)
- [范柏林](#)