



您当前的位置是: 首页 >> 资料库 >> 2006期 >> 第3期

双柏酊/蜜用于急性闭合性软组织损伤患者的效果观察

苏端 冯桂芳

(湛江市第一中医医院 湛江市第一中医医院 广东湛江 广东湛江)



资料库



浏览次数 241237

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		
2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

[摘要] 目的观察双柏酊/蜜用于急性闭合性软组织损伤的疗效。方法随机将139例急性闭合性软组织损伤患者分为两组, 观察组70例先用双柏酊冷敷后用双柏蜜热敷, 对照组69例使用活络油配合超短波理疗, 观察两组止痛、消肿, 祛淤及功能恢复的时间及效果。结果观察组与对照组在治疗急性闭合性软组织损伤的疗效上有显著性差异(P<0.01)。结论双柏酊/蜜用于急性闭合性软组织损伤, 止痛、消肿快, 祛淤和功能恢复时间短, 不留后遗症, 但护理不当可造成皮肤损害, 故关键要进行恰当的护理。

[关键词] 软组织损伤 急性 双柏酊 双柏蜜

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **299615** 位访客