

综述与编译

降低局部缺血性中风危险性的策略

张城¹, 卢曦²编译

(1. 军事医学科学院毒物药物研究所, 北京 100850; 2. 北京费森尤斯卡比医药有限公司, 北京 100004)

收稿日期 2004-9-1 修回日期 网络版发布日期 2009-6-3 接受日期

摘要 中风是一种常见的严重疾病。目前, 已认识到短暂的局部缺血的发作是中风的一种常见前兆。大多数中风属于原发性的缺血性中风。治疗急性缺血性中风的方法非常有限, 因此, 预防是降低中风复发和其他血管疾病危险性的重要措施。针对危险因素如高血压、糖尿病、吸烟和肥胖采取措施是预防中风的重要方法。血小板参与血栓和栓塞的形成, 这使抗血小板治疗成为重要的预防性策略。抗血小板药物可有效地防止缺血性中风的复发和其他血管缺血性疾病如心肌梗死和血管性死亡。在某些情况下, 抗凝血剂可以有效地预防缺血性中风的复发。对于中重度颈动脉狭窄的患者, 颈动脉内膜切除术可以降低中风的风险。根据患者的情况选择适当的治疗方法是预防中风的关键。

关键词 [局部缺血性中风](#); [抗血小板治疗](#); [合并用药](#); [阿司匹林](#); [氯吡格雷](#); [双嘧达莫](#); [噻氯匹啶](#)

分类号 [R972](#)

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(86KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“局部缺血性中风; 抗血小板治疗; 合并用药; 阿司匹林; 氯吡格雷; 双嘧达莫; 噻氯匹啶” 的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [张城](#)

· [卢曦](#)