

特约稿

46例严重急性呼吸综合征患者的临床特征与药物治疗

袁静, 骆子义, 胡毅文, 周伯平, 王召钦, 刘艳, 李炜

深圳市东湖医院, 518020

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 研究严重急性呼吸综合征(SARS)患者的临床特点与药物治疗方法. 方法: 对深圳地区46例SARS患者的临床表现、治疗及预后进行分析. 结果: ①男: 女=1.3: 1, 平均30.5岁, 儿童患者较少且一般不转为重症; 孕妇及>45岁的中老年人易转为重症. ②具有传染性强, 家庭及单位易群体发病的流行病学特点. ③所有患者均有发热, 弛张热多见, 平均发热病程(9.07±4.23) d. 多伴有呼吸道症状. 胸部X线片示肺部炎症多于发热后3~4 d出现, 平均持续(16.7±10.3) d. 易发生肝功能损害. CD+4/CD+8入院时平均为(17.9±5.6)%/(24.2±6.5)%, 明显下降. ④与普通患者比较, 重症患者年龄大、热程长, 双侧肺炎发生率高、炎症持续时间长, ALT升高发生率及升高程度较高, 入院时CD+4细胞计数下降程度更明显(P<0.05). ⑤易重症化(47.3%), 病死率为4.3%. 易发生I型呼吸衰竭(15.2%), 易发生肺纤维化(17.4%). ⑥肺纤维化发生率与患者年龄、病情、胸腺肽 α 1及短程肾上腺皮质激素使用有关. 结论: SARS患者的年龄大、热程长、双侧肺炎炎症持续时间长、肝功能损害、CD+4细胞计数明显下降等可作为早期判断SARS患者重症化的指标, 胸腺肽 α 1及短程皮质激素的使用可减少肺纤维化发生率.

关键词 [呼吸综合征, 急性, 严重](#) [临床表现](#) [药物治疗](#) [预后](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004 0781\(2003\)12 0832 03](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1110KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“呼吸综合征, 急性, 严重”的 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

- [袁静](#)
- [骆子义](#)
- [胡毅文](#)
- [周伯平](#)
- [王召钦](#)
- [刘艳](#)
- [李炜](#)