

用药指南

多烯磷脂酰胆碱与4种药物配伍稳定性考察

陈美花, 陆秀英, 陈晓蓓

杭州市第六人民医院, 310014

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的探讨多烯磷脂酰胆碱与丹参注射液、氨甲环酸、消旋山莨菪碱注射液、复方氨基酸的配伍稳定性。方法将多烯磷脂酰胆碱分别与丹参注射液、氨甲环酸、消旋山莨菪碱注射液、复方氨基酸按一定比例混合制成不同浓度的配伍试液, 观察外观沉淀反应。结果多烯磷脂酰胆碱与丹参注射液、氨甲环酸注射液、消旋山莨菪碱注射液、复方氨基酸注射液配伍时出现沉淀析出, 且 3~15 min 出现混浊沉淀, 24 h 后沉淀物无变化。结论科学安排输液顺序, 强调遇有多烯磷脂酰胆碱配伍禁忌的药物时隔开输入, 如无间隔液, 可征得医师同意, 用5%葡萄糖溶液将输液管中药物冲净后更换液体。

关键词 [多烯磷脂酰胆碱](#) [药物配伍](#) [药物稳定性](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2009-11-1515](#)

通讯作者:

作者个人主页: 陈美花; 陆秀英; 陈晓蓓

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(432KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“多烯磷脂酰胆碱”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [陈美花](#)
- [陆秀英](#)
- [陈晓蓓](#)