

药物与临床

通腑合剂预防化疗所致便秘

杨颖,何肇晴,汪锐,李靖,徐朱俊,陈丹,程杰,肖旭轩

(武汉市第一医院肿瘤科,430022)

收稿日期 2011-8-1 修回日期 2011-11-11 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 观察通腑合剂对化疗所致便秘的预防作用. 方法 选取化疗患者30例. 患者按化疗周期分成A、B、C 3组. 采用自身对照的方法, A组: 选取在第1周期化疗后出现不同程度的便秘腹胀症状的患者30例; B组: 在进入第2周期化疗时, 入组30例患者在出现便秘症状时给予通腑合剂20 mL, tid, po; C组第3周期化疗前1 d开始给予患者通腑合剂20 mL, tid, po. 选择各组排便费力感觉、大便性状、排便次数及腹胀持续天数等指标进行对比研究. 结果A、B、C组便秘、腹胀的持续时间分别为 (3.60 ± 1.04) , (2.00 ± 1.34) , (1.13 ± 1.20) d, 排便困难度分别为 (7.67 ± 1.02) , (5.21 ± 1.06) , (3.64 ± 1.33) , C组均较B组明显减少, 差异有统计学意义 $(P < 0.05)$. A组均便秘, B组便秘缓解率63.33%, C组便秘缓解率86.67%. A组均为便秘的粪形, B组8例(26.67%)大便性状恢复正常, C组19例(63.33%)大便性状恢复正常. 结论 预防性使用通腑合剂可明显缩短排便间隔及排便时程, 对患者的排便费力感觉和大便性状均有改善作用, 能有效预防化疗所致的便秘、腹胀.

关键词 [通腑合剂](#) [化疗](#) [便秘](#) [药物治疗法](#)

分类号 [R286](#) [R574.62](#)

DOI: 10.3870/yydb.2012.04.019

对应的英文版文章: [1004-0781\(2012\)04-0454-03](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1253KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“通腑合剂”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [杨颖](#)
- [何肇晴](#)
- [汪锐](#)
- [李靖](#)
- [徐朱俊](#)
- [陈丹](#)