

重症精神病患者长期药物治疗的耐药性分析

投稿时间：2012/1/31 最后修改时间：2012/4/30

DOI:

中文关键词：[精神病](#) [重症患者](#) [长期治疗](#) [耐药性](#) [合理用药](#)

英文关键词：

基金项目：

作者

单位

[陈国统](#)

[诸暨市第五人民医院（浙江诸暨 311800）](#)

摘要点击次数: 40

全文下载次数: 34

中文摘要:

摘要 目的：探讨重症精神病患者长期药物治疗后的耐药性，并分析其用药特点。**方法：**对我院2005年收治的重症精神病患者89例进行耐药性分析，总结药物使用情况，调查规范用药后的症状。采用化学光酶免疫法分析患者的血药浓度。**结果：**89例患者用药均在5年以上，23例患者用药量增加，8例患者症状加重。60例患者未出现药物增加，占67.74%。血药浓度在有效范围内未得到有效控制者9例，血药浓度在有效范围以上才能控制症状者13例。**结论：**重症精神病患者在临床治疗时采用长期的治疗方法，可能会出现耐药性，应定期对患者进行复查，根据患者的实际情况，调整用药量。

英文摘要:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

关闭