

- 益气清瘦汤
- 姜良铎:从人体状态辨治用药
- 神农本草经与山海经、本草纲目的关系
- 股骨头坏死的分期与治疗
- 痰热清注射液雾化吸入有益甲状腺术后患者

股 的

□ 张宏

股骨头坏死是由不同原因引起的股骨头的一种渐进性、致残性疾病。其诱因有激

股骨头坏死早期症状是髋关节或膝关节向大腿根部、臀后外侧或膝部放射。但原见于服药后3~18个月之间发病;酒精中毒痛表现为疼痛-缓解-疼痛。另一症状为髋而出现,呈间歇性;到晚期时,多为持续准确,但价格较贵。

股骨头坏死根据在X线片的表现分为Ⅱ期已有股骨头密度的变化,但股骨头的化;Ⅳ期除有上述表现,还呈典型的骨性期,已经不易辨别病变的原因。

股骨头坏死的治疗应根据不同的分期去除病因,激素性骨坏死患者应停止使用重。保守治疗的主要目的是减少或避免股用药物促进股骨头内的血液循环及骨质修地,3个月内不能负重;应用降血脂、扩

手术是股骨头坏死的根本治疗办法,细胞移植或钽棒植入;处在Ⅱ期病灶较大Ⅲ期可采用带血管的骨瓣转移术;Ⅳ期骨到正规医院进行诊治,以免贻误治疗的最

◀ 上一篇 下一篇 ▶

国内统一刊号: CN11-0153 邮发代号: 1-140(国内) D-1138
地址: 中国北京市朝阳区北沙滩甲四号 邮编: 100192 电话:
传真: 64854537 mail: cntcm@263.net.cn 广告热线: 6485
Copyright 本网站内容版权所有, 未经许可禁止转载, All Right