



论著 | 老中医经验 | 学术探讨 | 临床报道 | 中药与方剂 | 学院专栏 | 综述 | 短篇报道 | 成药研究  
消息 | 首医大中医药学院专栏 | 针灸经络 | 实验研究 | 燕京医史 | 中药房管理 | 临床中医学 | 中药制备 | 临床用药  
中成药与单味中药研究 | 中药炮制与鉴别 | 临床中药学

北京中医  
<http://bjtcm.itcmedu.com>



标准刊号：ISSN1000-4599 CN11-2558/R

• 本刊介绍 • 在线投稿 • 在线征订 >> 进入 北京中医药教育在线

会员登陆区

用户名：

密码：

忘记密码

[免费注册](#)

内容检索

请输入标题

请输入作者名

以往期刊查询

选择查询年份

选择查询期刊

精品推荐

2003年第6期 — 成药研究

## 桂枝茯苓胶囊治疗子宫肌瘤60例临床分

作者：张胜兰 点击次数：660次

【关键词】子宫肌瘤； 化瘀破痕法； 桂枝茯苓胶囊

【作者介绍】作者单位：102300，北京市门头沟区医院妇产科

子宫肌瘤是妇科常见病、多发病。目前常采用的治疗方法为期待疗法、药物疗法和手术治疗。我院于2001年1月-2001年12月，对在我院就诊的60例子宫肌瘤患者使用桂枝茯苓胶囊进行了临床观察。现报道如下。

### 1 临床资料

年龄在35-52岁的妇女，平均年龄43.5岁。诊断标准为：(1)经B超证实，子宫肌瘤患者有1个或多个瘤体，经三维测定瘤体最小经线 $\geq 2.5$ cm。(2)有明显的月经量过多、经期延长，伴有贫血症状。(3)用药前未用过其他药物治疗。

### 2 方法

60例患者口服由江苏康缘药业股份有限公司生产的桂枝茯苓胶囊，每日3次，每次4粒，饭后服用。

### 3 疗效统计

#### 3.1 疗效判断标准

显效：肌瘤缩小范围 $>5$ cm，月经量减少75%。有效：肌瘤缩小范围在3—5cm之间，月经量减少50%。好转：肌瘤缩小范围在2—3cm之间，月经量减少25%。无效：肌瘤无明显变小，月经量减少不明显。

#### 3.2 结果

60例肌瘤患者经3个月治疗后，显效7例(11.6%)有效37例(61.6%)，好转11例(18.3%)，无效5例(8.3%)，总有效率91.6%。

### 4 讨论

子宫肌瘤是由于子宫平滑肌组织增生而形成的良性肿瘤，其中含少量纤维结缔组织，是妇科的常见病、多发病。多见于中年妇女和更年期妇女。有些患者症状不明显，不被引起注意，往往在妇女病普查时发现，有些患者因月经量过多或经期延长就诊发现。根据中医理论，子宫肌瘤称为“瘕”证。本病多由于气血失调，郁怒伤肝，肝郁气滞，痰湿内蕴，瘀滞而成积块，肝肾两虚，冲任失调所致。治疗法则多以活血化瘀，软坚散结，缓消癌块。桂枝茯苓胶囊是以中药桂枝、茯苓及丹皮等组成，具有活血化瘀、破瘀散结、去瘀生新、理气止痛之功用，服用方便，副作用小，并能有效地治疗子宫肌瘤。我院观察有效率达91.6%，减少了肌瘤患者因手术带来的痛苦。

(收稿日期：2003-07-25)

[>>进入讨论](#)