



论著 | 老中医经验 | 学术探讨 | 临床报道 | 中药与方剂 | 学院专栏 | 综述 | 短篇报道 | 成药研究
消息 | 首医大中医药学院专栏 | 针灸经络 | 实验研究 | 燕京医史 | 中药房管理 | 临床中医学 | 中药制备 | 临床用药
中成药与单味中药研究 | 中药炮制与鉴别 | 临床中药学

北京中医
http://bjtcm.itcmedu.com



标准刊号：ISSN1000-4599 CN11-2558/R

· 本刊介绍 · 在线投稿 · 在线征订 >> 进入 北京中医药教育在线

会员登陆区

用户名:
密码:
忘记密码
免费注册

2004年第3期 — 短篇报道

中药治疗小儿支气管哮喘临床观察

作者：谌治芳¹ 许朝霞² 点击次数：549次

【关键词】小儿； 支气管哮喘； 中医药治疗

【作者介绍】作者单位：1. 445600, 湖北省咸丰县中医院中医科 2. 430030, 湖北省武汉市普爱医院中医科

内容检索

请输入标题

请输入作者名

以往期刊查询

选择查询年份
选择查询期刊

精品推荐

1 临床资料

36例患者均为1998-2003年10月的本院中医科门诊及病房的病人，1~6岁20例，7-14岁16例；男孩19例，女孩17例。均确为支气管哮喘，但不属于“支气管哮喘持续状态”。

2 治疗方法

中药自拟平喘方组成：太子参12g，沙参10g，生黄芪12g，贝母8g，炙麻黄6g，白芥子10g，苏子10g，莱菔子10g，金银花、10g，杏仁8g，厚朴10g，桑叶8g，石膏30g，桔梗10g。煎服法：1—6岁的患儿，用上药煎取汁120ml，每次30ml，每日4次，温服；7—14岁的患儿，用上药，煎取汁150ml，每次50ml，每日3次。1周为1个疗程，服药1—4个疗程，观察疗效。

3 疗效观察

3.1 疗效标准

临床治愈：喘息、胸闷、气短、咳嗽等症状消失，血象及胸片正常。好转：上述症状明显好转，血象正常，胸片正常或明显好转。无效：症状无明显好转，血象及胸片无明显好转。

3.2 观察内容

观察患儿的临床症状、血象、胸片在治疗前后的变化。

3.3 结果(见表1, 2)

临床治愈25例，占69.44%；好转8例，占22.22%；无效3例，占8.33%。

表1 治疗前后症状比较

时间	喘息	气短	咳嗽	大便干结
治疗前	36	36	33	21
治疗后	4	2	3	1

表2 治疗前后血象、胸片变化比较

时间	白细胞计数升高	嗜酸性粒细胞增高	肺纹理增粗	肺气肿
治疗前	21	12	23	9
治疗后	3	2	2	3

(收

稿日期：2004-01-02)

>>进入讨论