




第5版：农村与社区

上一版 < > 下一版



2009年9月16日 星期三

本报首页 | 版面导航 | 标题导航
[↑](#) 上一期 [↓](#) 下一期

< 上一篇 下一篇 >

放大 缩小 默认

4招治小儿腹泻

小儿腹泻是2岁以下婴幼儿常见的一种消化道疾病。是指排便次数增多，粪便稀薄，或如水样，或伴不化食物，或夹有黏液。

验方一

处方 云苓9克，焦山楂6克，车前子9克，鸡内金5克。

主治 小儿单纯性消化不良引起的腹泻。

用法 以上为2-5岁儿童用量，随年龄变化，酌情增减。水煎取药液100毫升，少量多次服。

验方二

处方 鲜无花果3枚。

主治 小儿腹泻。

用法 一岁以内的小儿2-3枚，一岁以上的3-5枚；取鲜无花果破开后水煎服，一日2-3次。

验方三

处方 云南白药适量。

主治 小儿急性腹泻，肛门发红者。

用法 将云南白药用75%的酒精或高度白酒调成膏状，用量多少以填满肚脐为度，用胶布或伤湿止痛膏固封，6小时一换，泻止后停用。若连用2天后腹泻仍未止，可用五倍子贴脐(见方四)，或改用其他治疗方法。

验方四

处方 五倍子10克。

主治 小儿久泻不止，肛门不红者。

用法 五倍子研成细末，每用3克左右，用温醋调成膏状，填贴肚脐内，用伤湿止痛膏或胶布固定，1-2日一换，泻止后停用，一般贴1-3次即可。(东健) D4

< 上一篇 下一篇 >

放大 缩小 默认

国内统一刊号：CN11-0153 邮发代号：1-140(国内) D-1138(国外)
地址：中国北京市朝阳区北沙滩甲四号 邮编：100192 电话：64854537
传真：64854537 mail:cntcm@263.net.cn 广告热线：64855366
Copyright 本网站内容版权所有，未经许可禁止转载， All Rights Resened