




第5版：农村与社区

上一版 < > 下一版



2009年4月10日 星期五

本报首页 | 版面导航 | 标题导航

< 上一篇 下一篇 >

放大 ⊕ 缩小 ⊖ 默认 ○

管灸疗法 治疱疹病毒性面神经炎

管灸疗法是对古代苇管灸的技术改良，管灸的效应通过外耳道、鼓膜、鼓室及薄骨板而直接达到面神经管，消除面神经管内的局部炎症水肿，解除受压神经的挤压，调节神经机能紊乱，达到临床治疗目的。本病多由外邪侵袭面部经络以致气血凝滞，肌肉弛缓不收。管灸能祛邪外出，使肌肉活动自如，且操作方便，重复性好，易于推广。

诊断标准

一、症状：发病突然，病前多有面部受凉、吹风或外感史；往往在晨起洗漱时发现口角漏水，或进食时食物存积于齿龈间，或因说话不便、闭目不全而被他人发现患病。部分患者有耳后、耳内、乳突区或/和面部轻度疼痛和/或麻木感及出汗减少。

二、体征：病侧面表情肌瘫痪。表现为：1.眼睑闭合不全，和/或泪液分泌减少；2.蹙额、皱眉均不能或不全；3.鼻唇沟平坦，口角下垂或张口和笑时被牵向健侧；4.病侧角膜反射消失；5.示齿、鼓腮、噘嘴、吹哨均不能或不全；6.可有舌前2/3味觉障碍，听觉过敏或听觉障碍。部分患者在耳郭、外耳道、鼓膜等处可见疱疹，乳突常有压痛。

具有上述典型症状，不能蹙额，且兼有示齿、鼓腮、噘嘴、吹哨任意1项不能或不全者，即可确诊为周围性面瘫(面神经炎)，并有疱疹病毒感染史，有耳郭、外耳道疱疹感染者，可确诊为疱疹病毒性面神经炎。

适应证

年龄18~65岁，病程少于7天的疱疹病毒性面神经炎患者。

禁忌证

- 一、有严重耳部感染性疾病的患者；
- 二、有严重高血压、糖尿病病史的患者；
- 三、对针灸过敏的患者。

技术操作方法

一、器械准备

1.纸管和管灸器：纸管长2~3厘米，直径约0.5厘米，由普通硬纸卷成。管灸器成烟管状，由上下两节套合在一起，下节为两端开口的中空木管，内有铁钉形成托物架；上节为顶端封口的中空木管，侧面有3个圆形开口，直径约0.8厘米，其中两个为通气孔以保证艾绒有氧燃烧，另一个为灸疗孔连接纸管。

2.针具：选用一次性针灸针，针长0.5~2寸，直径28~30号。

3.艾条：选用药用艾条，30克/支。

< 上一篇 下一篇 >

放大 ⊕ 缩小 ⊖ 默认 ○

国内统一刊号：CN11-0153 邮发代号：1-140(国内) D-1138(国外)
 地址：中国北京市朝阳区北沙滩甲四号 邮编：100192 电话：64854537
 传真：64854537 mail:cntcm@263.net.cn 广告热线：64853366
 Copyright 本网站内容版权所有，未经许可禁止转载。 All Rights Reserved