



论著 | 老中医经验 | 学术探讨 | 临床报道 | 中药与方剂 | 学院专栏 | 综述 | 短篇报道 | 成药研究
消息 | 首医大中医药学院专栏 | 针灸经络 | 实验研究 | 燕京医史 | 中药房管理 | 临床中医学 | 中药制备 | 临床用药
中成药与单味中药研究 | 中药炮制与鉴别 | 临床中药学

北京中医
<http://bjtcm.itcmedu.com>



标准刊号：ISSN1000-4599 CN11-2558/R

• 本刊介绍 • 在线投稿 • 在线征订 >> 进入 北京中医药教育在线

会员登陆区

用户名:

密码:

忘记密码

[免费注册](#)

内容检索

请输入标题

请输入作者名

以往期刊查询

选择查询年份

选择查询期刊

精品推荐

◆ 系统性红斑狼疮辨证论治探析

2004年第4期 — 临床报道

自拟镇肝降逆汤治疗中风后呃逆48例

作者：王国英 点击次数：392次

【关键词】 中风； 呃逆； 镇肝降逆法

【作者介绍】 作者单位：101200，北京市平谷区医院中医科

1. 1 病例选择

48例均为我院神经内科住院患者，并均经西医临床及头颅CT或MRI明确诊断。中医诊断符合1986年6月中华全国中医学会与卫生部中医急症中风病协作组修订《中风病中医诊断标准》中关于中风病急性期的诊断；此外参考1994年北京出版社出版、中国中医药学会内科学编委会主编《临床中医学》中关于呃逆证的诊断：1)大多突然起病。2)具有气逆上冲，喉间呃呃连声，声短而频。3)病人不能自制。4)伴胃脘不适、口中异样感觉等脾胃病症状。具备第2)、3)两条，参考第1)、4)两条，即可以确立呃逆证的诊断。

48例患者既往均无胃病史。经用西药解痉剂、镇静剂或针刺疗法等，呃逆无改善者列为总结病例。

1. 2 一般资料

48例中，男34例，女14例；年龄55—76岁，平均67岁。中风后出现呃逆的时间为2—5天，平均3.3天。属风火上扰清窍证21例，痰热腑实痰上扰证19例，痰热内闭清窍证8例。脑梗塞28例，脑出血20例。并发肺部感染8例，消化道出血5例。既往有高血压病史42例，脑梗塞史8例，冠心病史5例。有烟酒多年嗜好者27例。

1. 3 临床表现

中风后呃逆，以喉间呃声、声短而频、病人不能自制、半身不遂、大便秘结、舌质暗红、舌苔黄腻、脉弦滑为主要临床表现。

2 治疗方法

2. 1 西药基础治疗

脱水降颅压，保护脑细胞，维持电解质平衡，预防感染。

[>>进入讨论](#)