



论著 | 老中医经验 | 学术探讨 | 临床报道 | 中药与方剂 | 学院专栏 | 综述 | 短篇报道 | 成药研究  
消息 | 首医大中医药学院专栏 | 针灸经络 | 实验研究 | 燕京医史 | 中药房管理 | 临床中医学 | 中药制备 | 临床用药  
中成药与单味中药研究 | 中药炮制与鉴别 | 临床中药学

北京中医  
<http://bjtcm.itcmedu.com>



标准刊号：ISSN1000-4599 CN11-2558/R

• 本刊介绍 • 在线投稿 • 在线征订 >> 进入 北京中医药教育在线

会员登陆区

用户名:

密码:

忘记密码

免费注册

内容检索

请输入标题

请输入作者名

以往期刊查询

选择查询年份

选择查询期刊

精品推荐

2004年第3期 — 成药研究

## 血府逐瘀胶囊为主治疗输卵管阻塞31例

作者：周从容 谭仁坤 点击次数：591次

【关键词】输卵管阻塞； 中成药； 血府逐瘀胶囊

【作者简介】作者单位：610061，四川省成都市妇幼保健院

笔者十多年来，常以活血通瘀、纳肝补肾之法治疗因输卵管梗阻引起的不孕患者。现将红花牌血府逐瘀胶囊[天津宏仁堂药业有限公司(原天津第五中药厂生产)，治疗输卵管阻塞31例情况，报道如下。

### 1 临床资料

31例患者均系门诊病人，经腹腔镜下通液、输卵管碘油造影或输卵管通液诊断为输卵管阻塞者。年龄最大38岁，最小22岁，平均27岁；不孕年限最长者10年，最短者1年，平均3.5年。

### 2 治疗及观察方法

月经周期第1天起服血府逐瘀胶囊，每天2次，每次6粒，第15天停药。而后则根据中医辨证，辅以益气养血、滋肾补肾的汤剂，如八珍汤、寿胎丸之类，每日1剂，水煎取汁300ml，分温3服，直至第2次月经来潮。3个月为1个疗程，1个疗程后进行相应的复查。

### 3 治疗结果

#### 3.1 疗效判定标准

显效：治疗后经碘油造影、输卵管通液(两次)证实输卵管通畅或治疗后1年内受孕者。无效：经复查输卵管不通畅。

#### 3.2 治疗结果

31例患者治疗2个疗程后，显效27例，5：效6例，总有效率87%。

### 4 病案举例

樊某，女，26岁。初诊2003年4月16日。已婚6年未孕5年，1998年因右侧宫外孕、双输卵管畸胎瘤在某三甲医院手术治疗。2001年碘油造影示：右输卵管完全性梗阻；左输卵管伞端阻塞。诊断：继发不孕；输卵管阻塞。治疗于月经周期第1天服血府逐瘀胶囊，6粒/次，每日2次，服用至月经周期第15天；月经周期第16天予八珍汤加味，每日1剂，水煎取汁300ml，分温3服。治疗2个疗程后，于7月7日，当地医院就诊时诊断早孕。2003年10月14日随访：已孕4个月，孕期检查正常。

(收稿日期：2004—03—24)

>>进入讨论