



论著 | 老中医经验 | 学术探讨 | 临床报道 | 中药与方剂 | 学院专栏 | 综述 | 短篇报道 | 成药研究
消息 | 首医大中医药学院专栏 | 针灸经络 | 实验研究 | 燕京医史 | 中药房管理 | 临床中医学 | 中药制备 | 临床用药
中成药与单味中药研究 | 中药炮制与鉴别 | 临床中药学

北京中医
<http://bjtcm.itcmedu.com>



标准刊号：ISSN1000-4599 CN11-2558/R

· 本刊介绍 · 在线投稿 · 在线征订 >> 进入 北京中医药教育在线

会员登陆区

用户名:
密 码:
忘记密码
免费注册

内容检索

请输入标题

请输入作者名

以往期刊查询

选择查询年份

选择查询期刊

精品推荐

2004年第5期 — 短篇报道

血府逐瘀胶囊治疗椎动脉型颈椎病78例临床观察

作者：魏永南 点击次数：470次

【关键词】血府逐瘀胶囊;椎动脉型颈椎病;中成药

【作者介绍】作者单位：161000，黑龙江省齐齐哈尔和平医院内科

1 临床资料

共观察2002年12月31日—2003年12月1日本院内科专家门诊及综合病房椎动脉型颈椎病患者78例，其中男41例，女37例；年龄43—65岁，平均年龄(51±9.12)岁；病程3—23年，平均(8±3)年。所有病例均按1979年WHO临床命名标准化联合专题组提出的椎动脉型颈椎病命名及诊断标准。

2 治疗方法

应用天津宏仁堂药业有限公司(原天津市第五中药厂)出品的红花牌血府逐瘀胶囊，每日2次，每次3粒，4周为1个疗程。服药期间停用其它微循环活化剂、降低血脂、降低血粘度、扩张血管等药品。

统计学方法：应用t检验。

3 疗效观察

3.1 疗效评定标准

显效：眩晕、恶心、呕吐、耳聋、肢体感觉异常等症状有所缓解，颈椎多普勒彩色超声示椎动脉供血明显增加，血管痉挛明显缓解。好转：症状有所缓解，颈椎多普勒示痉挛或供血有所改善。无效：症状未改善，颈椎多普勒示椎动脉中度痉挛或供血严重不足。

3.2 结果

3.2.1 对血粘稠度的影响：见表1。

表1治疗前后血粘稠度的变化

观察项目	例数	治疗前	治疗后	P值
全血粘度比	78	4.95±0.83	4.51±0.66	<0.05
血浆粘度比	78	1.93±0.41	1.54±0.36	<0.05

3.2.2 治疗结果

78例患者中显效64例(82.05%)，好转13例(16.66%)，无效1例(1.28%)。总有效率为98.71%。

(收稿日期：2004—03—24)

>>进入讨论