



论著 | 老中医经验 | 学术探讨 | 临床报道 | 中药与方剂 | 学院专栏 | 综述 | 短篇报道 | 成药研究
消息 | 首医大中医药学院专栏 | 针灸经络 | 实验研究 | 燕京医史 | 中药房管理 | 临床中医学 | 中药制备 | 临床用药
中成药与单味中药研究 | 中药炮制与鉴别 | 临床中药学

北京中医
<http://bjtcm.itcmedu.com>



标准刊号：ISSN1000-4599 CN11-2558/R

· 本刊介绍 · 在线投稿 · 在线征订 >> 进入 北京中医药教育在线

会员登陆区

用户名:

密 码:

忘记密码

免费注册

内容检索

请输入标题

请输入作者名

以往期刊查询

选择查询年份

选择查询期刊

精品推荐

2004年第12期 — 临床中药学

开展中药临床药学刻不容缓

作者：北京大学首钢总医院药剂科(100041) 姬 鸣 点击次数：475次

首钢总医院从2003年1月—2003年11月共收到药物不良反应报告表70张，经统计其中中药造成的不良报告表有10张，占总数的14.3%，中药注射液造成的不良报告6张，占总数的8.6%。这两组数字说明了由中药造成的不良反应是不可忽视的，而且中药造成的不良反应将呈上升趋势，这是因为中药在临床应用呈上升趋势，而且由于剂型的改进，还不断有新的中药注射液应用临床，注射液不良反应要高于口服剂型。今年有6次报告中药注射液引起的反应，其中清开灵注射液3次、葛根素注射液2次，双黄连粉针1次；清开灵注射液造成的不良反应有过敏性休克、寒战、药疹，葛根素注射液造成的不良反应有头痛、皮肤瘙痒等；究其原因中药成份复杂，目前对其作用机理研究还不是十分清楚，而且有些药的有效成分就是蛋白质，象水牛角、珍珠母等，所以容易引起过敏反应。

口服中成药造成不良反应报告有3例共4种药物，最严重的是克银敌，它造成了急性造血细胞停滞，克银敌的严重不良反应在其它地方也有报道，这种不良反应应当属于处方组成上存在的问题。

还有一种更普遍存在的中成药造成的不良反应，在临床上也容易被忽视，原因是由中、西医两种医学体系诊病的指导思想不同而产生的。如中医诊治一位胃脘痛的病人，首先是要辨虚实、次辨气血、再辨寒热，由此得出一个“证”：或寒邪犯胃、或肝胃气滞、或胃热炽盛、或食滞肠胃、或瘀阻胃络、或胃阴亏虚等，医生再根据这个“证”选择病人所应该服用的药物。西医诊病无辨证，说明书写此药可治胃脘痛，那么确定一名胃脘痛的病人，不辨虚实，不辨寒热就用此药，可能对症，也可能不对症，对症的病好了，不对症的就要产生药物不良反应，因此更应该引起大家的注意。

[>>进入讨论](#)