

白水江自然保护区兽类调查初报*

马国璠

(天水师范专科学校生物系)

摘要 白水江自然保护区位于甘肃文县，是该省兽类资源最丰富的地区之一，也为大熊猫在该省唯一分布区。据笔者 1980 年 4 月至 1986 年 9 月在保护区工作期间所收集标本及文献，初步查明有兽类 59 种，隶属 7 目 21 科。其中臭鼩、四川短尾鼩、长吻鼩、鼩鼱、金管鼻蝠为甘肃省兽类新纪录。该区兽类中有 18 种列为国家或省级保护动物。

保护区兽类垂直分布较明显，并与该区植被垂直带相关。

一、自然概况

白水江自然保护区地处东经 $104^{\circ}17'$ — $105^{\circ}25'$ ；北纬 $32^{\circ}35'$ — $32^{\circ}50'$ 。东接四川省青川县，南以黄土梁与四川省平武县为界，西与四川省南坪县相接，北界西起白水江上游沿江东至文县碧口、中庙。以北还包括武都县洛塘河流域四个乡的范围。总面积 198,488 公顷（核心区 90,358 公顷，实验区 108,310 公顷）。

全境为南秦岭山地，属秦岭山脉的西延部分。此山自西北向东南斜贯保护区。区内山峦重迭，起伏较大。主要高峰有黄土梁、摩天岭、双猫山等。最高达 3600 米，一般高度在 1500—3100 米。山间河谷深陷，相对高差 1000—2500 米。岩石属沉积变质岩系，表层较破碎，深层较完整。水系属长江水系，白水江及其支流白马峪河、丹堡河、让水河贯穿全境，在玉垒汇入白龙江。洛塘河在姚渡汇入白龙江。区内气候温暖湿润，除河谷属亚热带温润气候外，大部分为暖温带温润气候。因多山地，气候垂直分布也较明显。年平均温度 15°C ，最高 37.5°C ，最低 -7.4°C 。无霜期 270 天左右，年降雨量 400—700 毫米。

二、兽类区系

1. 种类组成

文献报道本区兽类有 44 种（王香亭等 1982）。从 1980 年 4 月至 1986 年 9 月笔者多次调查，采集并结合文献资料共计兽类 59 种，属于 7 目 21 科。其中中鼩鼱、臭鼩、四川短尾鼩、长吻鼩、鼩鼱、金管鼻蝠为甘肃省兽类新纪录（见表 1）。

白水江自然保护区面积仅占甘肃省总面积的千分之一点二，而兽类占全省兽类总数（140 种）的 42.1%。足见本区兽类为甘肃省最丰富的地区之一。

2. 垂直分布

本区兽类垂直分布较明显，大致分四个类型。

(1) 低山常绿、落叶林带海拔 1000—1600 米。有大面积的农耕区和居民点，植被以麻栎、山楠、马桑、西北栒子、柳等组成的次生阔叶林为主。以啮齿类和小型兽类为主，褐家鼠、黑线姬鼠及社鼠为优势种，前者主要分布在居民点，后者常见于农田和灌丛。食虫类及啮齿类的捕食者黄鼬和豹猫多在此区活动。中型兽类有小麂和毛冠鹿，它们出没于灌丛中。各支流水域均有水獭。在农作物成熟季节，花面狸、

* 参加野外调查、采集的白水江自然保护区管理局科研究室部分同志。兰州大学生物系宋志明副教授提供有关啮齿类资料。四川省卫生防疫站王酉之先生热情帮助鉴定部分标本。谨此一并致谢。

表1 白水江自然保护区 哺类种类及分布

种 类	垂 直 带				数量*	出 处
	低山常绿落叶阔叶林 1000—1600米	中山混交林 1700—2900米	亚高山针叶林 3000—3400米	高山灌丛草甸 3500米以上		
1. 刺猬 <i>Erinaceus europaeus</i>	✓					文献
2. 小鼩鼱 <i>Sorex minusus</i>	✓	✓			+	文献
3. 中鼩鼱 <i>Sorex caecuticus</i>	✓				++	采集
4. 臭鼩* <i>Suncus murinus</i>	✓				+	采集
5. 四川短尾鼩 <i>Anourosorex squamipes</i>	✓	✓			++	采集
6. 小白齿鼩鼱 <i>Crocidura suavcolens</i>	✓	✓			++	文献
7. 鼬獾 <i>Scaptochirus moschatus</i>		✓			++	采集
8. 鼬獾 <i>Uropsilus soricipes</i>		✓			++	采集
9. 长吻鼹 <i>Talpa longirostris</i>		✓			++	采集
10. 伏翼蝠 <i>Pipistrellus abramus</i>	✓	✓			++	文献
11. 金管鼻蝠 <i>Murina aurata</i>		✓			+	采集
12. 金丝猴 <i>Rhinopithecus roxellanae</i>		✓			++	采集
13. 短尾猴 <i>Macaca speciosa</i>		✓			++	采集
14. 猕猴 <i>Macaca mulatta</i>		✓			++	文献
15. 高原兔 <i>Lepus oiostolus</i>					++	采集
16. 草兔 <i>Lepus capensis</i>	✓				++	采集
17. 岩松鼠 <i>Sciurotamias davidiannus</i>	✓	✓			++	采集
18. 隐纹花松鼠 <i>Tamiops swinhonis</i>					++	采集
19. 长吻松鼠 <i>Dremomys pernyi</i>		✓			++	文献
20. 小飞鼠 <i>Pteromys volans</i>		✓			++	文献
21. 高山鼯 <i>Petaurus xanthopterus</i>					+	采集
22. 沟齿鼯 <i>Aeretes melanophterus</i>					+	文献
23. 红白鼯 <i>Petaurus alborufus</i>			✓		++	文献
24. 中华竹鼠 <i>Rhizomys sinensis</i>			✓		++	采集
25. 中华鼢鼠 <i>Myospalax fontanieri</i>	✓		✓		++	采集
26. 黑腹绒鼠 <i>Eothenomys melanogaster</i>			✓		++	文献
27. 小家鼠* <i>Mus musculus</i>	✓		✓		+++	采集
28. 黑线姬鼠* <i>Apodemus agrarius</i>	✓		✓		+++	采集
29. 小林姬鼠* <i>Apodemus sylvaticus</i>	✓		✓		+++	采集
30. 大林姬鼠* <i>Apodemus peninsulae</i>			✓		+++	采集
31. 针毛鼠* <i>Rattus tuluensis</i>	✓		✓		++	采集
32. 社鼠* <i>Rattus niviventer confucianus</i>	✓		✓		++	采集
33. 白腹巨鼠 <i>Rattus coxingi andersoni</i>	✓		✓		++	采集
34. 福家鼠 <i>Rattus norvegicus</i>	✓		✓		+++	采集
35. 豪猪 <i>Hyrax hodgsoni</i>			✓		+	采集
36. 狼 <i>Canis lupus</i>	✓				+	观察*
37. 豹 <i>Leopardus pardalis</i>			✓		+	观察
38. 狐 <i>Vulpes vulpes</i>		✓			+	观察
39. 棕熊 <i>Ursus arctos</i>			✓		+	观察
40. 黑熊 <i>Selenarctos thibetanus</i>			✓		+	采集
41. 大熊猫 <i>Ailuropoda melanoleuca</i>			✓		+	采集
42. 青鼬 <i>Martes flavigula</i>			✓		+	采集
43. 黄鼬 <i>Mustela sibirica fontanieri</i>	✓		✓		+	采集
44. 猪獾 <i>Arctonyx collaris albogularis</i>	✓		✓		++	采集
45. 水獭 <i>Lutra lutra chinensis</i>	✓		✓		+	采集
46. 大灵猫 <i>Viverra zibetha</i>			✓		+	文献

表 1 (续)

种类	垂直带				数量*	出处
	低山常绿落叶阔叶林 1000—1600米	中山混交林 1700—2900米	亚高山针叶林 3000—3400米	高山灌丛草甸 3500米以上		
47.花面狸 <i>Paguma larvata</i>	✓	✓			++	采集
48.豹猫 <i>Felis bengalensis chinensis</i>	✓	✓	✓		++	采集
49.金猫 <i>Felis temminckii tristis</i>		✓	✓		+	观察
50.金钱豹 <i>Panthera pardus fusca</i>			✓	✓	+	观察
51.云豹 <i>Neofelis nebulosa</i>		✓	✓		+	观察
52.野猪 <i>Sus scrofa moupinensis</i>	✓	✓	✓	✓	++	采集
53.林麝 <i>Moschus berezovskii</i>		✓	✓	✓	++	采集
54.毛冠鹿 <i>Ritaphodus cephalophorus</i>	✓	✓	✓	✓	+	采集
55.小麂 <i>Muntiacus reevesi</i>	✓	✓			+	采集
56.麝 <i>Capreolus capreolus</i>				✓	+	观察
57.羚牛 <i>Budorcas taxicolor</i>		✓	✓	✓	++	采集
58.苏门羚 <i>Capricornis sumatraensis</i>		✓	✓	✓	+	采集
59.班羚 <i>Naemorhedus goral</i>		✓	✓	✓	+	采集

注: 1) + 为数量在 100 只以下, ++ 为数量在 100—200 只以内, +++ 为数量在 200 只以上。

2) 臭鼬标本为甘肃省地方病防治研究所李锡章同志 1981.7.21 在保护区內洛塘河采到。

3) 小家鼠、黑线姬鼠、大、小林姬鼠、针毛鼠、社鼠为兰州大学宋志明副教授调查资料。

4) 出处中“观察”为确有分布,但未收集到标本。

猪獾、豪猪等常到农区活动。

(2) 中山阔叶林和混交林带 海拔 1700—2900 米。常见有辽东栎、五裂槭、山白杨、红桦等。在海拔 2100 米左右出现铁杉、青杆、黄果冷杉等针叶树, 林下有大量箭竹生长。本地带兽类种类十分丰富, 区内大多兽类都在这一地带活动。啮齿类数量仅次于前一地带, 常见林姬鼠、岩松鼠等。大熊猫、金丝猴、羚牛常在海拔 2400 米以上地带活动, 班羚仅在悬崖峭壁地段栖息。

(3) 亚高山针叶林带 海拔 3000—3400 米。常见树种有紫果云杉、太白冷杉、岷江冷杉, 并有一些白桦、红桦、崖柳等阔叶树生长。林下箭竹生长上限在海拔 3100 米左右, 个别地段可达 3300 米。啮齿动物有林姬鼠、长吻松鼠、花

松鼠、白腹巨鼠等。大中型兽类有大熊猫、羚牛、苏门羚、黑熊及云豹等。箭竹丛内多有中华竹鼠。

(4) 高山灌丛草甸带 海拔 3300 米以上。常见灌木有陇蜀杜鹃、凝毛杜鹃、湖北花楸、忍冬、高山柳、金腊梅等, 草本有珠芽蓼、皱叶鹿蹄草、高山冷蕨、苔草、密花早熟禾、高山龙胆、川西绿绒蒿、滇藏紫菀等。本带兽类比较贫乏, 啮齿类有鼢鼠和大林姬鼠、并可见猪獾。靠近林缘的草坡常有林麝和苏门羚。羚牛夏季迁至这一带活动。

参 考 文 献

王香亭等 1982 甘肃哺乳动物区系研究 兰州大学学报(自然科学版) 18(2): 131—139。