

clipped 2K1C kidney [ J ]. *Hypertension* , 2003 ;41( 3 Pt 2 ) : 692 - 696.

[ 4 ] Sattar MA , Yusof AP , Gan EK , et al . Acute renal failure in 2K2C Goldblatt hypertensive rats during antihypertensive therapy : Comparison of an angiotensin AT1 receptor antagonist and clonidine analogues [ J ]. *J Auton Pharmacol* , 2000 20( 5-6 ) 297 - 304.

[ 5 ] 陈辉 , 张伶 , 朱旦 , 等 . 尼索地平对肾性高血压大鼠左室心肌重构的影响 [ J ]. *第四军医大学学报* , 2004 ;25( 6 ) : 515 - 518.

Chen H , Zhang L , Zhu D , et al . Effects of nisoldipine on the myocardial remodeling of left ventricle in renal hypertensive rats [ J ]. *Fourth Mil Med Univ* , 2004 25( 6 ) 515 - 518.

[ 6 ] Noll G , Wenzel RR , Shaw S , et al . Calcium antagonists and sympathetic nerve activation : Are there differences between classes ? [ J ]. *J Hypertension* , 1998 ;16 :s17 - s24.

[ 7 ] Esther EJ , Jennifer ND , Andrea MP , et al . Deficiency of TIMP1 exacerbates LV remodeling after myocardial infarction in mice [ J ]. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* , 2003 284 :H364 - H371.

[ 8 ] Iwanaga Y , Aoyama T , Kihara Y , et al . Excessive activation of matrix metalloproteinases coincides with left ventricular remodeling during transition from hypertrophy to heart failure in hypertensive rats [ J ]. *J Am Coll Cardiol* , 2002 ;39 :1384 - 1391.

[ 9 ] Pardomindan FJ , Panizo A . Alterations in the extracellular matrix of the myocardium in essential hypertension [ J ]. *Eur Heart J* , 1993 ; 14 :12 - 14.

[ 10 ] Mukherjee D , Sen S . Collagen phenotypes during development and regression of myocardial hypertrophy in spontaneously hypertensive rats [ J ]. *Circ Res* , 1990 ;67 :1474 - 1482.

编辑 何扬举

· 经验交流 · 文章编号 1000-2796(2005)07-0598-01

### 半夏泻心汤治疗慢性胃炎 2 例

肖茜

( 陕西中医学院 2000 级中西医结合 1 班 陕西 咸阳 712083 )

【关键词】半夏泻心汤 治疗 慢性胃炎

【中图分类号】R573.3 【文献标识码】B

**0 引言** 胃炎多属中医“胃脘痛”“嘈杂”“痞满”等范畴。湿易伤脾，热易损胃，而脾胃同居中焦，易同时受湿热所侵。又因“胃为之市”主纳谷消食，“脾为之使”主转谷化精，故脾胃化纳相助共同完成纳谷转精的功能。当外感六淫、饮食不慎或情志不舒，皆可致胃壅脾滞，在疾病早期胃阳尚旺或邪气较甚时，胃壅邪从热化，脾滞邪从湿化，湿热蕴结脾胃，气机壅滞，升降失职，从而导致疾病的发生。半夏泻心汤寒热互用以和其阴阳，苦辛并进以调其升降，补泻兼施以顾其虚实，使寒热得解，升降复常，则诸证自愈。

**1 病例报告** 例 1，女，36 岁，西安交大教师，患者因过食冷饮，胃脘隐痛 2 wk，心中嘈杂，就诊于外院，给予西药、中成药等，均未好转。2 d 前饭后，疼痛加剧，辗转反侧，彻夜不安。2003-05 于我院急查胃镜提示慢性胃炎，为求进一步治疗，在家人搀扶下缓慢走入我门诊，只见其身体蜷缩，双手按于胃脘部，观其舌淡红，苔薄黄而腻，脉弦紧。处方：半夏 9 g，干姜 6 g，黄芩 9 g，黄连 9 g，党参 9 g，甘草 6 g，木香 9 g，厚朴 9 g，陈皮 9 g，神曲 12 g。日一剂煎服，夜半痛减寐安，矢气频作，大便排出不化食物数块，3 剂后复诊，患者已不觉疼痛，仅感胃中略有不适，食纳差，舌淡，苔薄白，脉沉细无力。继用 3 剂而愈。

按：患者过食冷饮，以致寒邪凝结于胃，胃失和降，食滞内停，壅塞化热，而致寒热胶结，气机壅滞，升降失职，从而导致

诸证发生，以半夏泻心汤为主寒热并用，平调升降，加行气止痛之要药木香，下气宽中，消积导滞之厚朴，消食和胃之神曲；辨病辨证结合，诸证得消。

例 2，女，52 岁，咸阳七厂退休工人，因家务争吵，遂致心情不畅，渐感胃脘胀满不舒，纳呆，脘痛渐及右肋下，胸膈烦闷，心中灼热，暖气泛酸，大便干燥 4~5 d 1 次，小便短赤，如此者已 20 d 以上。经检查肝功正常，胃镜示胆汁返流性胃炎伴胃窦溃疡，舌淡红，苔薄黄而干，舌下静脉迂曲，脉细涩。处方：半夏 9 g，干姜 6 g，黄芩 9 g，党参 9 g，炙甘草 6 g，黄连 6 g，全瓜蒌 15 g，淡竹叶 9 g。水煎服，3 剂后，胃痛消失，胸部宽畅，食纳如常，右肋下未感疼痛，大便 1 次/d，小便清。舌淡，苔薄白，脉沉细。嘱咐患者服逍遥丸后功。

按：患者情志不畅，肝气郁结，肝胃不和，致胃壅脾滞，诸证得生，方以半夏泻心汤为主，加清热化痰，宽胸散结，润肠通便之全瓜蒌，清热除烦，通利小便之淡竹叶，理法方药环环相扣，药到证减。

**2 讨论** 《伤寒论》<sup>[1]</sup>曰：“若心下满而痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之。但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。”《金匮要略》<sup>[2]</sup>又云：“呕而肠鸣，心下痞者，半夏泻心汤主之。”前条为伤寒误下后虚其肠胃，则邪热陷于心下之轻证，后者为杂病中上为呕吐，下为肠鸣，寒热互结在胸中，脾胃升降失调，所谓“症”者，满而不实，胃脘满闷不舒的感觉。六腑以通为用，“痛则不通，通则不痛”。胃肠功能失和，阻滞不通，则会引起疼痛。此与现代医学所谓的胃炎颇相吻合。

胃炎表现症状颇多，平时加减获：干噎食臭，肠鸣下利者加生姜、陈皮；下利日久，完谷不化者，再加甘草、升麻；呕吐甚者加旋复花、代赭石、茯苓；吐酸甚者加香附（妇女尤宜）、牡蛎；大便稀溏加车前子、扁豆花；腹痛甚者加白芍、木香；体虚衰者以炮姜易干姜；心中灼热，小便黄者合小陷胸汤补中以防变，使脾胃调和，气机通畅，升降复其原职，清浊归其本位，邪去正复，诸症自消。

#### 【参考文献】

[ 1 ] 李培生，刘渡舟. 伤寒论讲义 [ M ]. 上海：上海科学技术出版社，1983 :82.

[ 2 ] 李克光. 金匮要略讲义 [ M ]. 第 5 版. 上海：上海科技出版社，1998 :125.

编辑 许昌泰

收稿日期 2004-12-31；修回日期 2005-01-07

作者简介：肖茜(1982-)，女(汉族)，陕西省西安市人。学生。Tel.

(029)83290985 Email: xiaoqq\_718@163.com