

山西省1990—1993年性病流行病学调查

山西省卫生防疫站(030012) 张丽霞

山西省近年来性传播疾病(STD)的发病逐年增多。通过1990~1993年的连续监测,基本摸清了我省性病的流行现状及发展趋势。

我省1990—1993年,全省12个地市共报告STD3602例,是前八年总和的2.73倍,年平均发病率为10.50/10万,年平均增长速度为14.55%。报告总发病数在全省各种法定传染病中,仅次于痢疾和肝炎而位居第三。

全省共报告STD七种:淋病、梅毒、尖锐湿疣、非淋菌性尿道炎(NGU)、软下疳、生殖器疱疹、性病性淋巴肉芽肿,未发现艾滋病病人及病毒感染者。其中淋病的病例数最多1986例(55.14%),其次是尖锐湿疣1462例(40.59%)。

发病率最高的是25—29岁年龄组(28.26/10万)。其次为30~39岁组(24.56/10万)和20~24岁组(21.08/10万)。其中81.84%的性病病例为20—39岁性活跃人群。

3602例性病病例中,男性2149例(59.66%),年平均发病率为12.11/10万,女性1453例(40.34%),年平均发病率为8.78/10万,男性发病专率高于女性。各种职业发病情

况,见附表。

山西省1990—1993年

附表 性病患者职业别发病情况

职业	发病数	构成比 (%)	年均发病率 (1/10万)
工人	1503	41.72	44.59
农民	504	13.99	4.36
干部职员	513	14.24	68.95
服务行业	163	4.52	18.93
无业及待业	281	7.80	41.86
个体劳动	171	4.75	35.11
儿童	73	2.02	7.66
学生	48	1.33	5.16
不详	346	9.63	—
合计	3602	100.00	10.50

在3602例中,太原市1624例,年均发病率26.18/10万,大同市714例,年均发病率13.98/10万;运城市791例,年均发病率40.19/10万,临汾市210例(8.93/10万),阳泉市130例(5.65/10万),晋中地区长治市、晋城市、忻州地区、吕梁地区、雁北地区、朔州市等也有病例报告。由此可见,我省性病的高发区主要为太原市、大同市和运城市。

(1995年8月20日收稿,1996年1月24日修订)