

1990年8月份疾病监测点疫情分析

1990年8月按时报告传染病疫情的监测点有132个。未及时报告疫情的监测点有：北京通县、山西平定县、辽宁大连沙河口区、辽宁凤城县、辽宁灯塔县、吉林长春市中关村区、广西罗城县、四川大足县、云南昆明官渡区、西藏拉萨市城关区、浙江永嘉县。

从监测点疫情报告反映的总的情况来看，夏秋季，肠道传染病发病增高，痢疾、感染性腹泻较前几个月增长，6月份，痢疾发病率为20.87/10万，感染性腹泻为118.6/10万，7月份，痢疾发病率为34.30/10万，感染性腹泻为97.32/10万，8月份，痢疾发病率为44.83/10万，感染性腹泻为165.02/10万，农村痢疾的报告发病率仍只有城市的1/2。感染性腹泻仅为1/12。

虫媒传染病的发病很高。

乙脑在全国的许多省份均有发病，在上海、华北、华东、华中、华南、西南、西北均有乙脑病例，月发病率已达1.52/10万，最高的地区在华中，发病率达3.34/10万，其次是华北和西北，发病率为2.20/10万和2.16/10万。在农村和城市均发现有乙脑病例，但在贫穷农村地区，乙脑发病达到3.35/10万。高出4.00/10万的监测点有17个，大

于10/10万的有湖南省凤凰县(14.71/10万)，安徽省蒙城县(13.22/10万)，贵州省安顺市(10.00/10万)。

另外钩体病在湖南省浏阳县、江西省武宁县、江西省龙南县有众多病例，这三个监测点的发病率已分别达到61.92/10万、37.58/10万和46.04/10万。

在华北地区，急性结膜炎发病很高，其发病率为509.91/10万，华东、华中和北京分别为104.92/10万、64.84/10万和51.44/10万。应引起各地警惕。

肺结核报告中，新疆的月发病率达165.99/10万，主要是和田巴格旗镇监测点报告了192例新发病例，该监测点的监测人口为36000人，是否准确，请核实。

另外，需要核实的是：在湖南省凤凰县和广西凌云县监测点报告炭疽病例有54例和4例。其发病率达49.64/10万和12.65/10万。若确实是，请监测点进行调查，并寄调查报告。

传染病诊断标准在1990年全国疾病监测工作会议上已经下发各监测点，下月报告疫情请注明疑似病例和确诊病例。

流研所疾病监测管理组