

## 贵州山茶属一新种——芳香短柱茶

谢立山 张贊英 夏丽芳

(中国科学院昆明植物研究所, 昆明)

## A NEW SPECIES OF THE GENUS CAMELLIA FROM GUIZHOU

Xie Lishan, Zhang Zhan Ying, Xia Lifang

(Kunming Institute of Botany, Academia Sinica, Kunming)

**关键词** 芳香短柱茶

**Key word** *Camellia odorata*

**芳香短柱茶 新种 图 1**

**Camellia odorata** L. S. Xie et Z. Y. Zhang sp. nov.

(Subgen. *Camellia*, Sect. *Paracamellia* Sealy)

Haec species affinis *C. grisei* Hance, sed a qua ramulis pedicellisque et foliis subtus costis pilosis, perulis velutinis vel sericeis, gemmis floralibus majoribus differt; a *C. weiningensis* Y. K. Li bracteis et sepalis velutinis, stylis brevioribus recedit.

Arbor parva, circ. 3—4 m alta; ramulis gracilibus, pilosis. Folia coriacea oblonga vel elliptica, 7—9 cm longa, 3.2—4.5 cm lata, apice acuta vel cuneata, supra nitida olivacea, subtus flavovirentibus ad costam pilosam, margine serrulata; nervis lateralibus utriscus 5—6 impressis, petiolo 0.8—1.0 cm longo, fulvo-piloso. Flores terminales vel axillares; gemma floris 1.7 cm longa, 0.7—0.9 cm lata; bracteis et sepalis 7—8, inaequalibus, coriaceis, velutinis, ciliatis, sub anthesi deciduisi, pedicellis pubescentibus; corolla 6.5—8 cm in diametro, alba, odorata, petala 5—6, obcordata, apice profunde biloba, 2.5—3.5 cm longa, 1.7—2.8 cm lata, basi cuneata leviter connata; staminibus 4.5—7 mm longis, 1—2 seriatis, extiminis basi cum petalorum basis adnascientibus, filamentis glabris, basi dimidiis parte connatis; ovario tomentoso triloculato; stylis 4 mm longis, glabis, liberis, stigmate sulcato. Fructus et semina ignotus.



图1 芳香短柱茶 *Camellia odorata* L. S. Xie et Z. Y. Zheng, 1.花枝;  
2.花瓣及部分雄蕊; 3.雄蕊腹面; 4.雄蕊背面; 5.花梗及雌蕊。(曾孝濂绘)

Guizhou (贵州): Chishui (赤水), Jingsha township, alt. s. m. 950 m, slop valley under forest, March 13. 1985, Xie Li-shan (谢立三) and Zhang Zan-ying (张赞英) 0751 (Typus! in KUN).

小乔木，高3—4米；树皮灰褐色，光滑；嫩枝细长，疏被柔毛，老枝表皮条状开裂，灰褐色或褐色；叶革质，叶片长椭圆形或椭圆形，长7—9厘米，宽3.2—4.5厘米，先端急尖至尾状渐尖，尖头长1.5—1.8厘米，基部圆，钝圆至宽楔形，叶面光亮，橄榄绿色，背面黄绿色，沿中脉疏被长柔毛，其余疏被短柔毛；侧脉5—6对，在叶面凹下，背面隆起，叶缘密被锯齿，齿宽约2.5毫米，齿尖骨质；叶柄长0.8—1.0厘米，黄褐色疏被柔毛。花单生于枝顶叶腋，花苞长约1.7厘米，直径0.7—0.9厘米，苞片和萼片7—8枚，不等大，最外二枚角质鳞片状，高约3—4毫米，宽8—9.5毫米，先端中部略被贴伏状绢毛，内轮萼片逐渐增大，盾状卵圆形，密被贴伏状银白色绢毛，边缘膜质，棕褐色，被丝状睫毛，于花期脱落，花梗长约5毫米，密被银白色绢毛，花冠直径6.5—8厘米，白色，芳香，花瓣5—6枚，长倒卵形，先端中部深二裂，长2.5—3.5厘米，宽1.7—2.8厘米，基部狭长，稍联合；雄蕊花丝长4.5—7毫米，1—2轮，外轮花丝联合约1/2，基部与花瓣贴生，花丝无毛；子房密被银白色绒毛，3室，花柱3条，长约4毫米，无毛，基部离生，柱头凹槽状。果实与种子未见。

本种与闽鄂山茶 *C. grijsii* Hance 相近，但小枝、叶背面及中脉被疏毛，花梗被柔毛，花苞较大，萼片被毛而不同；与威宁短柱茶 *C. weiningensis* Y. K. Li 相比，小枝、萼片被毛，花柱离生、较短而不同。