

广西槭属二新变种

TWO NEW VARIETIES OF ACER FROM GUANGXI

小叶樟叶槭 新变种

Acer cinnamomifolium Hayata var. ***microphyllum*** Fang et S. Y. Liang, var. nov.

A typo recedit foliis minoribus plerumque 5—8 cm longis et 2—2.5 cm latis, samaris minoribus 2—2.5cm longis, alis saepe suberectis.

Guangxi (广西): Lingchuan Xian (灵川县), alt. 150—650m., Apr. 27, 1964, S. Y. Liang (梁盛业) 6403062 (Typus conservatus in Facult. Biol., Univ. Szechuan. Chengdu; Isotypus in Herb. Inst. Silvs Guanxiens., Nanning).

* 本文曾得到关克俭先生、李安仁先生指导,在此一并致谢。

本变种与原变种的区别,在于叶较小,长5—8厘米,宽2—2.5厘米,翅果较小,长2—2.5厘米,张开近于直立。

长叶罗浮槭 新变种

Acer fabri Hance var. ***dolichophyllum*** Fang et S. Y. Liang, var. nov.

A typo recedit foliis majoribus rigidisque 10—16 cm longis et 4—5 cm latis, nervis lateralibus utrinsecus 13—15, subtus leviter conspicuis, samaris purpureis 3—3.5 cm longis, alis suberectis.

Guangxi (广西): Duan Xian (都安县), alt. 350—850 m., Maj. 8, 1979, S. Y. Liang (梁盛业) 7904281 (Typus conservatus in Herb. Facult. Biol., Univ. Szechuan., Chengdu; Isotypi in Herb. Inst. Silv. Guangxiens., Nanning, in Herb. Univ. Sunyatsen., Guangzhou, et in Herb. Inst. Bot. Guangxiens., Guilin).

本变种与原变种的区别在于叶较大而坚硬,长10—16厘米,宽4—5厘米,侧脉13—15对,在下面微显著,翅果紫色,长3—3.5厘米,翅张开近于直立。

方文培 Fang Wen-pei (Szechuan University) 梁盛业 Liang Sheng-ye (Guangxi Institute of Forestry)