

峨眉山栗属一新变种

A NEW VARIETY OF CASTANEA FROM OMEI SHAN

方文培

W. P. Fang

峨眉锥栗 新变种

本新变种与锥栗变种 *var. henryi* 的区别在于叶嫩时背面被星状浅绒毛, 雄花常3枚生于苞片的内侧, 雌花常单生于总苞内, 刺与果梗均被淡黄色星状浅绒毛。

四川西南部: 峨眉山, 1938年9月8日至1939年9月2日, 姚仲吾 3272, 5054; 同地, 1938年10月30日, 周鹤昌 8804; 同地, 1940年5月11日至1952年8月24日, 方文培 14320, 14809, 16628, 20967; 同地, 1940年5月26日, 郑万钧 10409; 同地, 1940年7月24日, 李彩祺 2967 (模式标本, 川); 同地, 1942年5月27日至9月14日, 周承烈 6179, 6537; 同地, 1952年5月17日, 熊济华、张秀实、蒋兴肇 30620, 30680; 同地, 1957年9月2日, 杨光輝 56006。

本新变种在峨眉山的万年寺、息心所新开寺海拔1000—1600米的林中比较常见。

Castanea henryi (Skan) Rehd. et Wils. *var. omeiensis* Fang, *var. nov.*

Castanea henryi sensu Fang, *Icon. Pl. Omeien.* 2 (1): pl. 112. 1945, pro parte, quoad specimina infra citata, non (Skan) Rehd. et Wils.

Differt a *var. henryi* foliis junioribus subtus stellato-tomentellis; floribus masculis plerumque sub bractea 3, femineis saepius in quoque involucre solitariis, aculeis pedunculisque flavido-stellato-tomentellis.

Szechuan, Mons Omei: C. W. Yao 3272, 5054; H. C. Chow 8804; W. P. Fang 14320, 14809, 16628, 20967; W. C. Cheng 10409; T.C. Lee 2967 (Typus, Herb. Department of Biology, Szechuan University, Chengtu, Szechuan.); C. L. Chow 6179, 6537; C. H. Hsiung, S. S. Chang & H. L. Tsiang 30620, 30680; K. H. Yang 56006.