

## 15 卷第 1 期“土沙苑”学名订正

本刊报道的“土沙苑不能代替沙苑子服用”一文中，关于土沙苑药材性状描述(1)崖州野百合种子与原植物不相符。经核对，该文所称的“崖州野百合种子”其原植物不是崖州野百合 *Crotalaria yaihsienensis* T. Chen 的种子，而是凹叶野百合 (*Crotalaria retusa* L.) 的种子。该文所描述的“凹叶野百合种子”为其未成熟的状态。现将两种植物种子形态分述如下：

(1) 凹叶野百合种子：呈三角状肾形或椭圆状肾形，长 4—6 毫米，宽 3—5 毫米，不成熟者黑褐色，有光泽，两侧显著压扁，凹窝明显。成熟者黄色或黄褐色，两侧饱满，有光泽，一边较宽圆截形而下弯成钩状，另一边狭钝圆，质坚硬，种仁两瓣，黄色，无嗅，嚼之豆腥味，味微苦。

(2) 崖州野百合种子：形态，气味与凹叶野百合种子相似，但种子明显较小，长 2.5—3 毫米，宽 2—2.5 毫米，不成熟者棕褐色，有凹窝，略有光泽。成熟者黑褐色，有光泽。

广州市药品检验所 李玉兰

---

\* 在《滇南本草》中有竹叶防风一条，经利彬所著《滇南本草图谱》中曾考证为 *Seseli* L. 属植物，但此名不能作为本属植物的代表种，故不宜以其为属名。