

# 马应龙麝香痔疮栓治疗肛窦炎 50 例

朱 翔

(福建中医学院中西医结合临床专业班,福州 350003)

**【摘要】 目的** 观察马应龙麝香痔疮栓肛内治疗肛窦炎的临床疗效。**方法** 肛窦炎患者 100 例,分为治疗组和对照组各 50 例。两组患者都口服头孢拉定分散片,每次 0.5 g,qid;甲硝唑片,每次 0.2 g,tid,患者便后,高锰酸钾-温水(1:5 000)坐浴 15 min。治疗组给予马应龙麝香痔疮栓 1 枚,纳肛内,qd。对照组以 2 mL 注射器抽取紫草膏 2 mL,注入肛内,qd。**结果** 治疗组平均治愈天数为(14.54±3.8)d,对照组为(20.2±4.3)d( $P<0.01$ );治疗组疼痛不适在 10 d 以内缓解 42 例(84.0%),对照组为 14 例(28.0%)。**结论** 马应龙麝香痔疮栓有较强的清热解毒、消肿镇痛、止血生肌的功效,治疗肛窦炎疗效确切。

**【关键词】** 马应龙麝香痔疮栓;肛窦炎

**【中图分类号】** R286;R574.8

**【文献标识码】** A

**【文章编号】** 1004-0781(2006)01-0045-01

肛窦和肛瓣发炎水肿称为肛窦炎或肛隐窝炎。由于炎症的慢性刺激,常伴肛乳头增生肥大。据统计约 85% 的肛门直肠疾病<sup>[1]</sup>,如肛周脓肿、肛痿、肛裂、肛乳头肥大等是由肛窦感染引起的。因此,积极有效的治疗措施,对预防肛门直肠疾病的发生具有重要意义。2000 年 4 月~2004 年 7 月,笔者以马应龙麝香痔疮栓作为治疗肛窦炎的外用栓剂,效果颇佳。报道如下。

## 1 资料与方法

**1.1 临床资料** 从门诊肛窦炎患者中随机选取 100 例,按《中华肛肠病学》诊断标准确诊<sup>[2]</sup>,即排便不尽感或肛门坠胀,排便时灼痛或裂痛,肛周瘙痒,难用手抓止痒,反射到尾部疼痛,指诊齿线处有触痛,肛门镜下可见肛瓣充血水肿。100 例患者中,男 62 例,女 38 例,年龄 25~70 岁,平均 36.2 岁。采用配对组设计法将其分为治疗组和对照组各 50 例。

**1.2 治疗方法** 两组患者都口服头孢拉定分散片,每次 0.5 g,qid;甲硝唑片,每次 0.2 g,tid。两组患者便后,高锰酸钾-温水(1:5 000)坐浴 15 min,治疗组给予马应龙麝香痔疮栓(武汉马应龙药业集团股份有限公司生产,批准文号:国药准字 Z42021461)1 枚,纳肛内,qd。对照组以 2 mL 注射器抽取本院

自制紫草膏 2 mL,注入肛内,qd。观察两组的症状缓解情况,平均痊愈天数。

## 2 结果

结果两组患者皆治愈,症状体征消失,其中治疗组平均治愈天数为(14.54±3.8)d,对照组平均治愈天数为(20.2±4.3)d。同时还发现治疗组肛门疼痛不适的症状缓解速度较对照组为快。治疗组疼痛不适在 10 d 以内缓解 42 例(84.0%),对照组为 14 例(28.0%),两组疗效经  $\chi^2$  检验,差异有极显著性( $P<0.01$ )。

## 3 讨论

正常的肛窦排便时呈闭合状,粪渣不易进入。当干粪块擦伤造成肛窦撕裂或排便次数增多肛窦被堵塞时,易造成细菌感染。中医认为肛窦炎多因饮食不节,过量食用醇酒厚味和辛辣等刺激之品而致;或因泄泻和痢疾等湿热之邪下注肛门;或因肠燥便秘,虫积骚扰,以致肛门破损而成。马应龙麝香痔疮栓中麝香、牛黄、珍珠能消肿生肌,冰片、三七能消肿镇痛,五倍子能清热解毒,诸药协同,具有非常好的清热解毒、消肿镇痛、止血生肌的功效,治疗肛窦炎疗效确切,值得推广应用。

## 【参考文献】

- [1] 安阿玥. 肛肠病学[M]. 北京:人民卫生出版社,1998. 140.
- [2] 景建中,李国栋. 中西医结合治疗肛肠病的进展[J]. 中级医刊,1994,29(7):428-429.

**【收稿日期】** 2005-04-12

**【修回日期】** 2005-06-13

**【作者简介】** 朱 翔(1973-),男,福建福州人,福建省级机关医院主治医师,在读硕士,主要从事肛肠科临床工作。电话:0591-87798163,E-mail:zhuxiang120757@sina.com。

## 2006 年《医药导报》各期药物专栏要目

第 1 期 心血管系统用药专栏

第 2 期 老年病用药专栏

第 3 期 抗结核病用药专栏

第 4 期 麻醉科用药专栏

第 5 期 儿科用药专栏

第 6 期 中药及天然药物专栏

第 7 期 疫苗及分子生物药物专栏

第 8 期 抗微生物药物专栏

第 9 期 内分泌及代谢病用药专栏

第 10 期 精神科用药专栏

第 11 期 泌尿系统和男科用药专栏

第 12 期 皮肤性病用药专栏

若投专栏稿件,请至少在该期出版前 6 个月将稿件寄来,以便及时送审和处理稿件。谢谢!

《医药导报》编辑部