

地奥司明治疗静脉曲张性混合痔 58 例

邱钢林

(湖北省中医学院教学医院、武汉市第八医院肛肠科,430010)

[摘要] 目的 观察地奥司明片治疗静脉曲张性混合痔的疗效和安全性。方法 静脉曲张性混合痔患者 112 例,分为两组。治疗组 58 例,给予地奥司明片,每次 3 片,bid,po;对照组 54 例采用常规抗炎、止血治疗。疗程均为 7 d。结果 治疗组和对照组痊愈率分别为 41.4% 和 25.9% ($P > 0.05$);总有效率分别为 93.1% 和 68.5% ($P < 0.05$)。结论 地奥司明片治疗静脉曲张性混合痔效果较好,无明显不良反应。

[关键词] 地奥司明;痔,混合,静脉曲张性;便血

[中图分类号] R286;R657.18

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-0781(2009)12-1594-01

痔是人类最常见疾病之一。解剖学上痔是因肛管血管垫(简称肛垫)发生病理性肥大、增厚和移位,血管(静脉)扩张、扭曲和静脉团形成^[1,2]。

地奥司明片为微粒化纯化的黄酮成分,由地奥司明和橙皮苷复合而成,是一种静脉亲和性药物,其活性成分是微粒化和纯化的地奥司明,可提高静脉的紧张性,促进淋巴回流,降低毛细血管通透性,提高毛细血管的渗透性和抵抗力,并可作用于白细胞-血管内皮细胞的相互作用过程,可对许多炎症产生影响^[3,4]。2008 年 1~12 月,笔者采用地奥司明片治疗静脉曲张性混合痔,观察其临床疗效。

1 资料与方法

1.1 临床资料 静脉曲张性混合痔患者 112 例,男 68 例,女 44 例,年龄 30~80 岁,平均 45 岁。80% 患者有 >1 a 痔疮病史,90% 患者有便血,78% 患者有肛痛,分为治疗组 58 例,对照组 54 例。两组在性别、年龄、病程等方面差异无显著性 ($P > 0.05$),具有可比性。

1.2 治疗方法 治疗组给予地奥司明片(马应龙药业集团股份有限公司生产,批准文号:国药准字 H20066737,规格:每片 0.5 g),每次 3 片,bid,po;对照组采用常规抗炎、止血治疗。疗程均为 7 d^[5]。

1.3 疗效判定标准 痊愈:临床症状、体征基本消失,症状与体征积分减少 $\geq 95\%$;显效:症状和体征明显减轻,症状与体征积分较少 70%~94%;有效:症状和体征减轻,症状与体征积分较少 30%~69%;无效:症状与体征积分减少 $< 30\%$ ^[6]。

1.4 统计学方法 采用 SPSS13.0 统计分析软件进行数据处理及分析。计数资料用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有显著性。

2 结果

两组患者治疗 7 d 后,治疗组痊愈率 41.4%,总有效率 93.1%;对照组治愈率 25.9%,总有效率 68.5%。两组痊愈率差异无显著性 ($P > 0.05$),总有效率差异有显著性 ($P < 0.05$)。两组均未见明显不良反应。见表 1。

表 1 两组患者临床疗效比较

组别	例数	痊愈		显效		有效		无效	
		例	%	例	%	例	%	例	%
治疗组	58	24	41.4	20	34.5	10	17.2	4	6.9
对照组	54	14	25.9	8	14.8	15	27.8	17	31.5

3 讨论

静脉曲张性混合痔是齿线以下痔外静脉丛曲张,在肛门缘形成圆形、椭圆形或棱形柔软肿块,处在同一部位的直肠齿线上下静脉丛同时曲张、扩大、充血,相互沟通吻合,括约肌间沟消失。齿线上方的痔核表面为直肠黏膜,齿线下方的痔表面为肛管皮肤覆盖,也即俗称的内痔部分与外痔部分所形成的一个整体。主要表现为便血、突出、疼痛,给患者的生活、工作带来诸多痛苦和不便;而长期便血,则使人体虚弱,甚至产生面色萎黄、头晕、眼花、乏力等贫血症状^[7]。地奥司明片可选择性作用于静脉系统,改善痔动脉吻合,降低毛细血管后静脉张力,促进痔静脉回流,减轻静脉曲张型混合痔的临床症状,并可作用于白细胞-血管内皮细胞的相互作用过程,可对许多炎症产生影响。由于地奥司明片中的活性成分已经微粒化,可以增加药物的生物利用度,增快药物起效速率,从而能有效减少静脉曲张型混合痔各种症状,缩短了治疗时间,经济实惠。

[DOI] 10.3870/yydb.2009.12.027

[参考文献]

[1] 张东铭. 盆底与肛门病学[M]. 贵阳: 贵州科技出版社, 2000: 375-377

[2] 郁宝铭, 林建江, 吴唯勤, 等. 微粒化纯化的黄酮成分治疗痔急性发作的多中心自身对照临床研究[J]. 中华普通外科杂志, 2004, 19(12): 722-724.

[3] 贺平, 谢敏江, 张楨, 等. 地奥司明用于痔外剥内扎术后 48 例[J]. 医药导报, 2008, 27(9): 1081-1082.

[4] 王世文, 张颖. 地奥司明片治疗痔急性发作 1100 例[J]. 医药导报, 2009, 28(1): 76-77.

[5] 朱明炜, 曹金铎, 曾纯智, 等. 地奥司明片治疗痔 29 例临床分析[J]. 大肠肛门病外科杂志, 2000, 6(2): 40.

[6] 徐勤娥, 吴文溪, 周士芳, 等. 国产地奥司明片的 II 期临床研究[J]. 江苏医药杂志, 2006, 32(4): 379-381.

[7] 黄乃健. 中国肛肠病学[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 1996: 430-433.

[收稿日期] 2009-08-04

[作者简介] 邱钢林(1956-), 女, 河南人, 副主任医师, 从事肛肠科临床工作。电话: (0)13006177510, E-mail: qiuganglin@126.com。