

# 复方云南白药预防老年患者拔牙后并发症

谭 凤,王建华,王迎升

(山东省荣城市人民医院口腔科,264300)

[关键词] 云南白药,复方;并发症,拔牙

[中图分类号] R286

[文献标识码] B

[文章编号] 1004-0781(2002)01-0024-01

拔牙后伤口出血、干槽症是常见的并发症,特别对老年患者而言,发病率更高。我们采用自制复方云南白药在预防拔牙后并发症取得满意疗效,现报道如下。

## 1 资料与方法

1.1 临床资料 随机选择在我科就诊的平时无出血倾向,出、凝血时间正常的患者 88 例,年龄 50~80 岁,男 48 例,女 40 例。牙体有严重广泛的龋齿不能修复者;有严重根尖周围病变不能保留者及晚期牙周病者,合计 101 只牙,按随机双盲原则分为治疗组和对照组,治疗组 48 只牙,对照组 53 只牙。

1.2 药绵制备 云南白药 4.0 g × 2 瓶,冰硼散 1.5 g × 4 瓶均匀混合,加入普鲁卡因肾上腺素 10 mL 制成混悬液,将明胶海绵(广州南方制药三厂生产)剪成 3.0 cm × 2.0 cm × 0.5 cm 大小,放入上述混悬液中浸泡至饱和后进行加压、灭菌,留待备用。

1.3 治疗方法 患牙常规拔除,随后按两组分别拔牙创伤后旋转药棉,治疗组用自制药绵,对照组用普通牙垫,嘱患者咬紧,30 min 后取出,观察术后 1,2,3 d 及 1 周后拔牙创面恢复情况,记录并发症的发生牙数并作

[收稿日期] 2001-08-28

[作者简介] 谭 凤(1973-),女,山东荣城人,医师,从事口腔外科治疗工作。  
记录。

## 2 结果

治疗组拔牙后出现出血、疼痛、感染分别为 2,1,1 例,并发症的发生率为 8.3%,对照组拔牙后出现出血、疼痛、感染、干槽症分别为 8,3,4,3 例,并发症的发生率分别为 34.0%。两组拔牙后并发症的发生情况经统计学处理,差异有极显著性( $P < 0.01$ ),表明复方云南白药用于预防老年患者拔牙术后并发症有显著疗效。

## 3 讨论

复方云南白药对预防术后并发症有明显疗效,其主要成分为参三七,具有止血化瘀,消炎镇痛,化腐生肌的作用<sup>[1]</sup>;冰硼散有消炎镇痛、化腐生肌之功效;甲硝唑对口腔厌氧菌具有明显的抗菌作用<sup>[2]</sup>;盐酸肾上腺素可兴奋  $\alpha$ -受体,引起皮肤、粘膜及内脏血管收缩,局部应用可止血。明胶海绵本身具有止血作用,另外可引起压迫止血,且不会脱落,无须取出,明胶海绵可自行溶解,吸收,无异物反应。

## 参考文献

- [1] 孙树椿,孙之镐. 中医筋伤学[M]. 北京:人民卫生出版社,1996. 233.
- [2] 张举之,樊明文. 口腔内科学[M]. 第 3 版. 北京:人民卫生出版社,1999. 312.

# 头孢唑啉钠致发热白细胞减少 1 例

王存玉<sup>1</sup>,李惠云<sup>2</sup>

(山东省威海市文登中心医院 1. 骨外科;2. 药剂科,264400)

[关键词] 头孢唑啉钠;白细胞减少;发热;不良反应

[中图分类号] R978.11

[文献标识码] B

[文章编号] 1004-0781(2002)01-0024-01

患者,男,22 岁,因左前臂玻璃割伤,在当地医院清创缝合后 1 周伤口裂开,鲜血外溢,左手麻木,2000 年 10 月 30 日急诊入手术室探查。术中见左桡动脉、桡神经浅支断裂,部分肌肉断裂,给予桡动脉结扎,肌肉缝合。术后给予头孢唑啉钠(石家庄制药集团有限公司)4.0 g 加入 0.9% 氯化钠溶液 250 mL 中,

[收稿日期] 2000-12-25

[作者简介] 王存玉(1969-),女,山东威海人,大专,护师。

静脉滴注,bid,0.2% 环丙沙星 100 mL,静脉滴注,bid。2000 年 11 月 5 日停用环丙沙星,2000 年 11 月 18~20 日连续 3 d 晚间出现发热(38.0℃~39.3℃)。经肌肉注射复方氨基比林 2 mL 后,体温下降,白天体温正常。血常规:WBC  $2.6 \times 10^9 \cdot L^{-1}$ ,患者伤口愈合良好,肺及泌尿系统无感染征象,请血液科会诊,排除血液病,因头孢唑啉钠应用时间较长,考虑为头孢唑啉钠所