

## 第二节 Urysohn 引理及其应用

**Th2.2 (Urysohn 引理)** 如果拓扑空间  $X$  满足  $T_4$  公理, 则对于  $X$  的任意两个不相交闭集  $A$  和  $B$ , 存在  $X$  上的连续函数  $f$ , 它在  $A$  和  $B$  上分别取值为 0 和 1。

**注 1:** Urysohn 引理的结论是  $T_4$  公理的等价条件。

**Th2.3 (Tietze 扩张定理)** 如果拓扑空间  $X$  满足  $T_4$  公理, 则定义在  $X$  的闭子集  $F$  上的连续函数可以连续地扩张到  $X$  上。

**注 2:** Tietze 扩张定理的结论是  $T_4$  公理的等价条件。

一个拓扑空间  $(X, \tau)$  称为**可度量化**的, 如果可以在集合  $X$  上规定一个度量  $d$ , 使得  $\tau_d = \tau$ 。

**Pro1.** 拓扑空间  $X$  可度量化  $\Leftrightarrow$  存在从  $X$  到一个度量空间的嵌入映射。

**Pro2.** 拓扑空间  $X$  的可度量化性质具有同胚不变性。即若  $X \cong Y$ ,  $X$  可度量化, 则  $Y$  也可度量化。

**证明:** 设集合  $X$  上度量  $d$ , 满足  $\tau_d = \tau$ ,  $f: X \rightarrow Y$  是同胚映射。规定集合  $Y$  上的度量  $\rho(x, y) = d(f^{-1}(x), f^{-1}(y))$ , 则需证明  $\rho$  是  $Y$  上的度量, 由  $\rho$  诱导的拓扑就是  $Y$  上原来的拓扑。

$$(1) \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow d(f^{-1}(x), f^{-1}(y)) = 0 \Leftrightarrow f^{-1}(x) = f^{-1}(y) \Leftrightarrow x = y ;$$

$$(2) \rho(x, y) = d(f^{-1}(x), f^{-1}(y)) = d(f^{-1}(y), f^{-1}(x)) = \rho(y, x) ;$$

$$(3) \rho(x, y) + \rho(y, z) \geq d(f^{-1}(x), f^{-1}(y)) + d(f^{-1}(y), f^{-1}(z)) \\ \geq d(f^{-1}(x), f^{-1}(z)) = \rho(x, z)$$

故  $\rho$  是  $Y$  上的度量。

设  $Y$  上原来的拓扑为  $\tau'$  , 则  $\tau' = \{U \mid U = f(V), V \in \tau\}$ 。而

$\tau' = \{U \mid U = f(V), V \in \tau\} = \{U \mid U \text{ 是若干个 } f(B_d(x, \varepsilon)) \text{ 的并} \} (\varepsilon > 0)$  。

$f(B_d(x, \varepsilon)) = f(\{y \mid d(y, x) < \varepsilon\}) = \{f(y) \mid d(y, x) < \varepsilon\} = B_\rho(f(x), \varepsilon)$

$\tau_\rho = \{U \mid U \text{ 是若干个 } B_\rho(y, \varepsilon) \text{ 的并} \} (y \in Y, \varepsilon > 0)$  于是  $\tau' = \tau_\rho$ 。

**Th2.4 (度量化定理)** 拓扑空间  $X$  如果满足  $T_1, T_4$  和  $C_2$  公理, 则  $X$  可嵌入到 *Hilbert* 空间  $E^\infty$  中。

**Th2.5** 若拓扑空间  $X$  是  $T_2$  空间, 则  $X$  可度量化  $\Leftrightarrow X$  具有  $\sigma$  局部有限基。

**作业 : P49 Ex2、 Ex4**