

连通性（二）

引理 若 X_0 是 X 的既开又闭的子集， A 是 X 的连通子集，则或者 $A \cap X_0 = \phi$ ，或者 $A \subset X_0$ 。

证 $A \cap X_0$ 是 A 的既开又闭的子集，因 A 是 X 的连通子集，故 $A \cap X_0 = \phi$ 或 $A \cap X_0 = A$ ，即 $A \subset X_0$ 。

命题 2.22 若 X 有一个连通的稠密子集，则 X 连通。

证 设 A 是 X 的连通稠密子集， X_0 是 X 的既开又闭的子集。若 $X_0 \neq \emptyset$ ，则 $A \cap X_0 \neq \phi$ ，由引理知 $A \subset X_0$ 。于是

$$X = \bar{A} \subset \bar{X}_0 = X_0,$$

从而 $X_0 = X$ ，因此， X 连通。

推论 若 A 是 X 的连通子集， $A \subset Y \subset \bar{A}$ ，则 Y 连通。

命题 2.23 如果 X 有一个连通覆盖 μ (μ 中每个成员都连通)，并且 X 有一个连通子集 A ，它与 μ 中每个成员都相交，则 X 连通。

Example1

$$A = \{(x, \sin \frac{1}{x}) \mid x \in (0, 1)\}, \quad B = \{(0, y) \mid -1 \leq y \leq 1\},$$

$X = A \cup B$ ，则 X 连通。

证 因 $A \cong (0, 1)$ ， $\bar{A} = X$ ，故 X 连通。

Example2 \mathbb{R}^2 连通。

证 设 $B_x = \{(x, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$, 则 $\{B_x \mid x \in \mathbb{R}\}$ 是 \mathbb{R}^2 的连通开覆盖。记 $A = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$, 则 A 连通 , 且 $A \cap B_x \neq \emptyset$, 由命题 2.23 知 \mathbb{R}^2 连通。

Example 3 \mathbb{R}^n 连通。(道路连通, 去掉可数个点还是道路连通)

Example 4 S^n 连通。

证 $S^n - \{x\} \cong \mathbb{R}^n$ 连通, $S^n - \{x\}$ 是 S^n 的稠密子集, 故 S^n 连通。

定理 2.8 连通性是可乘的。

证 设 X 和 Y 都是连通空间, 则 $\{X \times \{y\} \mid y \in Y\}$ 是 $X \times Y$ 的连通覆盖。取 $x \in X$, 则 $\{x\} \times Y$ 连通, 且与每个 $X \times \{y\}$ 都相交, 故 $X \times Y$ 连通。

连通分支

定义 2.7 拓扑空间 X 的一个子集称为 X 的连通分支, 如果它是连通的, 并且不是 X 的其他连通子集的真子集。(极大连通子集)

命题 2.24 X 的每个非空连通子集包含在唯一的一个连通分支中。

证 (存在性) 设 A 是 X 的一个非空连通子集, 设

$\mu = \{F \subset X \mid F \text{ 连通}, F \cap A \neq \emptyset\}$ 。 $Y = \bigcup_{F \in \mu} F$ ，则 $A \subset Y$ 。根据

命题 2.23， Y 连通。若连通子集 $B \supset Y$ ，则 $B \cap A = A \neq \emptyset$ ，从而 $B \in \mu$ 。故 Y 是连通分支。

（唯一性）若 Y' 也是包含 A 的连通分支，则 $Y' \in \mu$ ，因而 $Y' \subset Y$ 。由 Y' 的极大性得 $Y' = Y$ 。

Example 1 \mathbb{Q} 中的连通分支是单点集。

命题 2.25 连通分支是闭集。

证 设 A 是 X 的一个连通分支，根据命题 2.22， \bar{A} 连通。由 A 的极大性知 $\bar{A} = A$ 。因此 A 是闭集。