

考试科目: (861) 高等代数 共 2 页

★★★★ 答题一律做在答题纸上, 做在试卷上无效。★★★★

一、填空题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1、设  $a, b, c$  是方程  $x^3 + px + q = 0$  的三个根, 那么行列式  $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$  ;

2、设  $A, B$  均为  $n$  阶正交矩阵, 且  $|A| = -|B|$ , 则行列式  $|A+B|$  的值为  $\underline{\hspace{2cm}}$  ;

3、已知  $n$  阶方阵  $A$  和  $n$  阶单位阵  $E$  满足  $2A(A-E) = A^3$ , 则  $(E-A)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$  ;

4、当  $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$  时, 方程组  $\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1, \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1. \end{cases}$  无解;

5、设  $A$  为 4 阶方阵,  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵, 且  $A$  的秩  $R(A) = 2$ , 则  $A^*$  的秩  $R(A^*) = \underline{\hspace{2cm}}$  ;

6、二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 4x_2^2 - 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$  的秩为  $\underline{\hspace{2cm}}$  ;

7、设三阶矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ , 向量  $\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 若  $A\vec{\alpha}$  与  $\vec{\alpha}$  线性相关, 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$  ;

8、已知  $n$  阶方阵  $A$  的  $n$  个特征值分别为  $2, 4, 6, \dots, 2n$ ,  $E$  为  $n$  阶单位阵,

则行列式  $|A-3E| = \underline{\hspace{2cm}}$  ;

9、实数域上全体 3 阶上三角矩阵对于矩阵加法和数乘运算构成的线性空间是  $\underline{\hspace{2cm}}$  维的;

10、已知三维线性空间  $V$  上的线性变换  $T$  在基  $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$  下的矩阵为  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ , 那么

线性变换  $T$  在基  $\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$  下的矩阵为

$\underline{\hspace{2cm}}$  .

二、(15分) 证明: 已知  $n$  维向量组  $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_r$  可以由向量组  $\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_2, \dots, \vec{\beta}_s$  线性表示, 这里  $r > s$ ,

证明: 向量组  $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_r$  一定线性相关。

三、(15分) 已知  $n$  阶方阵  $A$  满足  $A^2 - 3A + 2E = 0$ , 证明: 矩阵  $A$  相似于对角矩阵。

四、(20分) 已知实对称阵  $A$  的顺序主子式全大于或等于零, 证明:  $A$  是半正定的。

五、(20分) 证明:  $n$  维欧氏空间中任意一个正交向量组都可以扩充为一组标准正交基。

六、(20分) 设实数域上  $n$  阶矩阵

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

(1) 如果  $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| (i, j = 1, 2, \dots, n)$ , 证明  $A$  的行列式  $|A| \neq 0$ ;

(2) 如果  $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| (i, j = 1, 2, \dots, n)$ , 证明  $A$  的行列式  $|A| > 0$ .