

电子科技大学

2015 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目：695 口腔综合

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上均无效。

一、 名词解释（总分 30 分，每题 3 分）

1. 预防性树脂充填术：
2. 根尖诱导成形术：
3. 双膦酸盐性颌骨坏死：
4. 表层皮片：
5. 功能性印模：
6. 牙周潜力：
7. 眶耳平面：
8. 腮腺床：
9. 急性坏死性溃疡性龈炎：
10. 非霍奇金淋巴瘤：

二、 选择题（总分 210 分，每题 2 分）

1. 颞下颌关节前脱位时，髁突的位置在关节结节的
 - A. 前上方
 - B. 前下方
 - C. 前方
 - D. 后方
 - E. 下方

2. 上颌窦呈锥形空腔，其尖指向
- A. 额突
 - B. 颧突
 - C. 牙槽突
 - D. 腭突
 - E. 鼻腔
3. 乳牙萌出顺序哪一个是正确的
- A. I II V IV III
 - B. I II III V IV
 - C. I II IV III V
 - D. V I II IV III
 - E. I II V III IV
4. 为减小基牙负担，桥体设计时应考虑
- A. 减小颊舌径的宽度
 - B. 降低桥体合面宽度
 - C. 采用金属与树脂材料
 - D. 设计成卫生桥
 - E. 尽量扩大邻间隙
5. 诊断邻面龋最准确的方法是
- A. 视诊
 - B. 探诊
 - C. 温度刺激试验
 - D. 染色法
 - E. 咬合片
6. 上颌义齿远中游离端基托的颊侧应
- A. 覆盖整个上颌结节
 - B. 覆盖上颌结节的 $\frac{2}{3}$
 - C. 覆盖上颌结节的 $\frac{1}{2}$
 - D. 覆盖上颌结节的 $\frac{1}{3}$
 - E. 让开上颌结节
7. 下列备洞原则中哪项是错误的
- A. 尽可能去尽腐质
 - B. 尽可能保留健康的牙体组织
 - C. 所有的窝沟点隙均需做预防性扩展
 - D. 后牙邻面侧壁应扩展到接触区以外的自洁区
 - E. 外形线应建立在正常的牙体组织上

8. 牙隐裂检查时最有帮助的检查是

- A. 视诊
- B. 探诊
- C. **X-ray**
- D. 涂碘染色
- E. 温度试验

9. 引起慢性牙髓炎的主要疾病是

- A. 深龋
- B. 楔状缺损
- C. 急性牙周炎
- D. 发育异常
- E. 重度牙周病

10. 鉴别急性牙髓炎可用

- A. 电诊法
- B. **X-ray**
- C. 染色法
- D. 麻醉试验
- E. 嗅诊

11. 下列为根管预备的目的，除外

- A. 清除感染源
- B. 扩大根管便于根管消毒
- C. 扩大根尖孔，以利引流
- D. 减少弯曲根管的弯曲度
- E. 预备根管形态，以利充填

12. 下列为根管充填的时机，除外

- A. 无自觉症状
- B. 根管内无渗出
- C. 取出棉捻无臭物
- D. 临床检查无异常所见
- E. 根尖病变明显缩小

13. RPI 卡环组中邻面板的主要作用是

- A. 防止义齿龈向移位
- B. 增强义齿的固位
- C. 有利美观
- D. 减少基牙所受扭力
- E. 防止食物嵌塞

14. 龈上菌斑主要与下列疾病有关，除外
- A. 点隙沟裂龋
 - B. 光滑面龋
 - C. 邻面龋
 - D. 牙龈炎
 - E. 牙周炎
15. 与内分泌有关的牙周病，除外
- A. 青春期龈炎
 - B. 青少年牙周炎
 - C. 妊娠性龈瘤
 - D. 妊娠期龈炎
 - E. 糖尿病型牙周炎
16. 假性牙周袋与真性牙周袋的区别是
- A. 牙周袋的深度
 - B. 牙周袋的形状
 - C. 牙周袋底的位置
 - D. 牙龈有无增生或肿胀
 - E. 牙龈有无炎症
17. 可鉴别疱疹性口疮与疱疹性口炎的是哪一项
- A. 针刺反应
 - B. 有无皮损
 - C. 疼痛程度
 - D. 病损大小
 - E. 预后
18. 复发性口腔溃疡很少见于
- A. 唇红
 - B. 颊粘膜
 - C. 舌缘
 - D. 硬腭
 - E. 移行沟
19. 急性根尖周炎脓肿切开的主要临床依据是
- A. 扪诊有波动感
 - B. 剧烈疼痛
 - C. 根尖区牙龈肿胀压痛
 - D. 体温 38℃ 以上
 - E. 患牙叩痛明显

20. 判断窒息最有力的依据是
- A. 烦躁不安
 - B. 呼吸急促
 - C. 锁骨上、肋间隙、剑突下出现凹陷
 - D. 出冷汗、脉速
 - E. 鼻翼煽动
21. 下列骨折中哪一种可能发生舌后坠，引起窒息
- A. 下颌骨颏部粉碎性骨折
 - B. 上颌骨 Lefort III型骨折
 - C. 下颌正中单线骨折
 - D. 左颞孔区骨折
 - E. 双髁突颈骨折
22. 唇、舌、耳、鼻及眼睑断裂伤，离体组织尚完好，临床掌握将离体组织缝合回原处的最长时间不超过
- A. 3 小时
 - B. 5 小时
 - C. 6 小时
 - D. 7 小时
 - E. 8 小时
23. 哪一项不属于导致骨折延期愈合或不愈合的因素
- A. 未能及时复位、固定
 - B. 复位不准确
 - C. 固定不牢靠
 - D. 未行颌间结扎
 - E. 清创不充分
24. 拔牙创充满血液后形成血凝块而封闭伤口约需要
- A. 10 分钟
 - B. 40 分钟
 - C. 30 分钟
 - D. 15 分钟
 - E. 5 分钟
25. 舌癌多发生于
- A. 舌尖
 - B. 舌背
 - C. 舌侧缘
 - D. 舌腹
 - E. 舌根

26. 牙周炎骨吸收的最初表现是
- A. 牙槽骨高度降低
 - B. 牙槽骨密度减低
 - C. 牙槽骨呈角形吸收
 - D. 硬骨板增厚
 - E. 牙槽嵴顶的硬骨板消失
27. 对于腮腺区肿物，哪种检查是不恰当的
- A. 细针吸细胞学检查
 - B. CT
 - C. 涎腺造影
 - D. B超
 - E. 活检
28. 颌面部单蒂皮瓣的最大长宽比例可达
- A. 2 : 1
 - B. 3 : 1
 - C. 4 : 1
 - D. 5 : 1
 - E. 6 : 1
29. 利多卡因一次最大用量为
- A. 10-50mg
 - B. 80-100mg
 - C. 300-400mg
 - D. 800-1000mg
 - E. 1500mg
30. 容易引发药物过敏性口炎的药物是
- A. 解热镇痛药、安眠镇静药、磺胺类药、维生素
 - B. 解热镇痛药、抗生素类药、安眠镇静药、磺胺类药
 - C. 解热镇痛药、安眠镇静药、磺胺类药、无机盐类药
 - D. 解热镇痛药、安眠镇静药、维生素、抗生素类药
 - E. 解热镇痛药、安眠镇静药、磺胺类药、复方氨基酸制剂
31. 常用的牙种植体种类为
- A. 骨内种植体
 - B. 骨膜下种植体
 - C. 粘膜下种植体
 - D. 牙内种植体
 - E. 牙内骨内种植体

32. 以下疾病中病损一般不出现于硬腭的是
- A. 带状疱疹
 - B. 急性疱疹性龈口炎
 - C. 口腔念珠菌病
 - D. 疱疹样口疮
 - E. 手足口病
33. 通常前牙金属烤瓷唇面龈边缘的最佳选择是
- A. 龈上凹形边缘
 - B. 龈下肩台边缘
 - C. 龈上肩台边缘
 - D. 龈下凹形边缘
 - E. 平龈边缘
34. 与全冠咬合面形态设计无关的因素是
- A. 固位位置
 - B. 抗力因素
 - C. 牙周状态
 - D. 邻牙合面形态
 - E. 对侧牙冠是否完好
35. 全冠口内试戴时应检查的问题是
- A. 咬合、就位
 - B. 就位、龈边缘
 - C. 龈边缘、咬合、就位
 - D. 接触点、咬合、就位
 - E. 接触点、咬合、就位、龈边缘
36. 前牙的根管工作长度是指
- A. 牙实际长度
 - B. 牙根管长度
 - C. 开髓口到根尖端的长度
 - D. 切端到根尖狭窄部的长度
 - E. X线片上的牙齿长度
37. 鳞状细胞癌除其恶性特征外还需具备
- A. 角蛋白形成和细胞间桥出现
 - B. 巢状结构和细胞间桥出现
 - C. 团块状结构和细胞间桥出现
 - D. 片状结构和细胞间桥出现
 - E. 核分裂象和细胞间桥出现

38. 牙齿二度松动是指
- A. 用力摇动时有轻微动度
 - B. 颊舌向及近远中向均有动度
 - C. 颊舌向有动度
 - D. 垂直向及近远中向均有动度
 - E. 颊舌向及垂直向有动度
39. 桩冠中冠桩长度的要求为
- A. 至少距根尖部 0.5-1mm
 - B. 至少距根尖部 1-2mm
 - C. 至少距根尖部 2-3mm
 - D. 至少距根尖部 3-5mm
 - E. 至少距根尖部 5-8mm
40. 不适合烤瓷冠修复的是
- A. 锥形牙
 - B. 错位前牙
 - C. 四环素牙
 - D. 青少年恒牙
 - E. 活髓牙
41. 固定义齿的组成包括
- A. 桥基牙、固位体、桥体
 - B. 桥基牙、桥体、连接体
 - C. 桥基牙、固位体、连接体
 - D. 固位体、桥体、连接体
 - E. 桥基牙、固位体、桥体、连接体
42. 可摘局部义齿塑料基托的平均厚度为
- A. 1mm
 - B. 1.5mm
 - C. 2mm
 - D. 2.5mm
 - E. 3mm
43. 磨牙合支托的宽度为
- A. 磨牙近远中径的 $\frac{1}{4}$
 - B. 磨牙近远中径的 $\frac{1}{3}$
 - C. 磨牙近远中径的 $\frac{1}{2}$
 - D. 磨牙颊舌径的 $\frac{1}{2}$
 - E. 磨牙颊舌径的 $\frac{1}{3}$

44. 铸造合金的厚度为
- A. 0.5-1.0mm
 - B. 1.0-1.5mm
 - C. 1.5-2.0mm
 - D. 2.0-2.5mm
 - E. 2.5-3.0mm
45. 一般情况下，可摘局部义齿固位体的数目应
- A. 尽可能多
 - B. 4-6 个
 - C. 2-4 个
 - D. 1-2 个
 - E. 尽可能少
46. 原位癌的病变范围是
- A. 癌细胞累及上皮浅 $\frac{1}{3}$
 - B. 癌细胞累及上皮浅 $\frac{2}{3}$
 - C. 癌细胞累及上皮全层
 - D. 癌细胞突破基底膜
 - E. 癌细胞浸润到上皮下方
47. 腮腺床不包括哪一结构
- A. 颈内动脉
 - B. 颈内静脉
 - C. 颈外动脉
 - D. 迷走神经
 - E. 舌咽神经
48. 牙萌出的时间是指哪一个时间
- A. 牙冠出龈的时间
 - B. 牙冠完全萌出的时间
 - C. 牙达到咬合接触的时间
 - D. 牙冠在隐窝中开始移动的时间
 - E. 牙冠萌出 $\frac{2}{3}$ 的时间
49. 根管最狭窄的地方在哪里
- A. 约距根尖孔 1mm 处
 - B. 约距根尖 1mm 处
 - C. 约距根中 $\frac{1}{3}$ 与根尖 $\frac{1}{3}$ 交界处
 - D. 约距根颈 $\frac{1}{3}$ 与根中 $\frac{1}{3}$ 交界处
 - E. 约在根管口处

50. 天疱疮病理改变的主要部位是
- A. 上皮基底膜
 - B. 上皮基底细胞
 - C. 上皮棘层细胞
 - D. 上皮粒层细胞
 - E. 上皮角化层
51. 对急性大面积或多灶性糜烂性扁平苔藓的肾上腺皮质激素治疗应采用
- A. 大剂量，短疗程
 - B. 大剂量，长疗程
 - C. 小剂量，短疗程
 - D. 小剂量，长疗程
 - E. 以上都不是
52. 下列有关舌乳头的描述，哪项是错误的
- A. 丝状乳头在舌体表面
 - B. 菌状乳头司味觉
 - C. 叶状乳头位于舌侧缘后部
 - D. 轮廓乳头位于界沟前方，有味蕾
 - E. 舌根部粘膜舌乳头较少
53. 根尖囊肿的病理改变不包括
- A. 囊壁内衬复层鳞状上皮
 - B. 基底细胞呈柱状，胞核呈栅栏状排列
 - C. 囊壁内常有慢性炎症细胞浸润
 - D. 常含胆固醇裂隙
 - E. 可见透明小体
54. 髓腔增龄变化的结果是
- A. 髓腔变小，髓角更呈凸起
 - B. 髓室顶和髓室底间的距离缩小
 - C. 髓室增大，髓角消失
 - D. 髓室底离根分叉处越来越近
 - E. 根尖孔逐渐增大
55. 颌骨骨髓炎 X 线呈“虫蚀状”低密度区的病理基础是
- A. 骨膜增生，骨膜加厚
 - B. 骨组织增生，骨小梁增粗
 - C. 骨组织吸收，骨小梁结构不清
 - D. 死骨形成，肉芽组织充填
 - E. 新骨形成，骨小梁不规则

56. 牙拔除术时，当患者患有下列哪类疾病时，局麻药中应慎用肾上腺素 D
- A. 肿瘤
 - B. 血友病
 - C. 精神病
 - D. 甲状腺功能亢进
 - E. 肺结核
57. 第一恒磨牙牙胚形成于
- A. 出生前后
 - B. 胚胎第四个月
 - C. 胚胎第四周
 - D. 胚胎第二个月
 - E. 胚胎第二周
58. 世界卫生组织 2005 年对口腔鳞癌的分级主要依据
- A. 肿瘤大小
 - B. 组织学特征
 - C. 浸润深度
 - D. 淋巴结转移否
 - E. 病程长短
59. 面部发育异常出现于
- A. 胚胎第三至第四周
 - B. 胚胎第六至第七周
 - C. 胚胎第九周
 - D. 胚胎第十周
 - E. 胚胎第六月
60. 扁平苔藓病变上皮
- A. 表面不角化
 - B. 只表现棘层增厚
 - C. 基底细胞增殖明显
 - D. 基底膜界限不清
 - E. 固有层内淋巴细胞浸润常达粘膜下层
61. 上皮的棘层或基底层出现个别或成群的细胞角化称为
- A. 过度角化
 - B. 过度正角化
 - C. 过度不全角化
 - D. 角化不良
 - E. 棘层增生

62. 外渗性黏液囊肿表现以下特点，除了
- A. 直径多为 5-10mm
 - B. 囊腔内含粘液及炎症细胞
 - C. 多数囊壁有上皮衬里
 - D. 囊壁由肉芽组织或纤维结缔组织组成
 - E. 囊壁内有吞噬细胞和炎症细胞
63. 不易癌变的白斑类别是
- A. 疣状型白斑
 - B. 白斑呈白皱纸状
 - C. 白斑基底有浸润
 - D. 发生在左侧舌腹部的白斑
 - E. 无明确原因的白斑
64. 牙本质中的胶原蛋白主要为
- A. I 型
 - B. II 型
 - C. III型
 - D. IV型
 - E. V型
65. 涎腺腺样囊性癌最具侵袭性的成分是
- A. 筛孔状结构
 - B. 小导管结构
 - C. 小条索结构
 - D. 实性型结构
 - E. 以上都不是
66. II类洞型咬合面鸠尾形设计根据
- A. 邻面龋的深浅
 - B. 邻面龋的位置
 - C. 邻面龋的牙位
 - D. 邻面龋的类型
 - E. 邻面洞的大小
67. 复层鳞状上皮由表层向内的排列顺序为
- A. 颗粒层、角化层、棘层和基底层
 - B. 角化层、颗粒层、棘层和基底层
 - C. 颗粒层、棘层、角化层和基底层
 - D. 基底层、棘层、颗粒层和角化层
 - E. 基底层、角化层、棘层和颗粒层

68. 光固化复合树脂充填时，分层光照每层的厚度不超过

- A. 0.5mm
- B. 1.0mm
- C. 1.5mm
- D. 2.0mm
- E. 2.5mm

69. 处理深龋时，可以分次去腐质的仅为

- A. 年轻恒牙急性龋
- B. 年轻恒牙慢性龋
- C. 成年人急性龋
- D. 成年人慢性龋
- E. 老年人静止龋

70. 充填后的下列临床表现中，不是牙髓炎引起的为

- A. 冷水引起尖锐痛
- B. 咬硬物感觉酸痛
- C. 热测引起迟缓痛
- D. 晚饭后隐隐作痛
- E. 阵发性自发疼痛

71. 牙根形成的多少取决于

- A. 成釉器
- B. 牙乳头
- C. 牙囊
- D. 上皮根鞘
- E. 上皮隔

72. 釉质发育不全与釉质龋的区别为

- A. 釉面有缺损
- B. 釉面白垩斑
- C. 探硬而光滑
- D. 患者无症状
- E. 釉面色素斑

73. 慢性闭锁性牙髓炎的临床表现，除外

- A. 不定时的自发痛
- B. 热测引起迟缓痛
- C. 洞内探及穿髓孔
- D. 叩诊多有不适感
- E. 有过自发痛病史

74. 急性牙髓炎诊断的主要步骤是
- A. 先查患牙，后问诊，做温度测验
 - B. 先温度测验，后查患牙，问诊
 - C. 先问诊，后温度测验
 - D. 先问诊，再查牙，后温度测验
 - E. 先麻醉止痛，再问诊，检查
75. 年轻恒牙深龋不能用哪种材料垫底
- A. 氧化锌丁香油糊剂
 - B. 羧酸水门汀
 - C. 磷酸锌水门汀
 - D. 氢氧化钙
 - E. 玻璃离子水门汀
76. 乳牙根管治疗中不正确的是
- A. 药物失活牙髓前应有牙片参考
 - B. 揭净髓室顶完全暴露根管口
 - C. 拔髓时可保留根尖 $1/3$ 的牙髓
 - D. 选用刺激性小的药物进行根管消毒
 - E. 选用可吸收的药物根充
77. 引起水平性食物嵌塞的因素是
- A. 邻面接触点不正常
 - B. 斜度过陡的牙尖
 - C. 食物溢出沟消失
 - D. 两邻牙边缘嵴高低不一
 - E. 牙龈退缩
78. 成人牙周炎时牙龈表现为
- A. 牙龈粉红色
 - B. 牙龈肿胀光亮
 - C. 牙龈质地坚韧
 - D. 龈沟深度 2mm 以内
 - E. 牙龈无出血
79. 牙周炎与边缘性龈炎区别点在于牙周炎表现为
- A. 龈缘有炎症
 - B. 龈乳头红肿
 - C. 形成假性牙周袋
 - D. 牙不松动
 - E. 牙槽骨破坏吸收

80. 咬合创伤时 X 线片常表现为
- A. 牙槽骨垂直吸收
 - B. 牙槽骨水平吸收
 - C. 牙周膜变窄
 - D. 牙槽骨广泛一致的密度减低
 - E. 无牙槽骨改变
81. 下列哪个部位与白塞病无关
- A. 口腔
 - B. 眼
 - C. 皮肤
 - D. 指甲
 - E. 生殖器
82. 选择纵式或横式褥式缝合的根据是
- A. 术者习惯
 - B. 创口区域皮纹方向
 - C. 创缘血供方向
 - D. 创口周围是否存在重要的解剖结构
 - E. 创口内翻倾向的严重程度
83. 处理深龋前，最重要的是
- A. 问清患者的主诉
 - B. 判断牙髓的情况
 - C. 查清龋洞的深度
 - D. 探查腐质软硬度
 - E. 进行 X 线片检查
84. 结核性脓肿的脓液特点
- A. 淡黄稀薄脓液
 - B. 翠绿色稍稠脓液酸臭味
 - C. 黄色粘稠脓液
 - D. 灰白似米汤、内有干酪样坏死物
 - E. 灰白似米汤、内有硫磺颗粒物质
85. 下列间隙感染中腺源性感染常见于
- A. 咽旁间隙
 - B. 翼颌间隙
 - C. 颌下间隙
 - D. 舌下间隙
 - E. 颞下间隙

86. 上颌骨骨折后骨块最可能移位的方向为
- A. 前上
 - B. 后下
 - C. 前方
 - D. 后上
 - E. 左右
87. 以下涎腺肿瘤中最易发生种植复发的是
- A. 肌上皮瘤
 - B. 多形性腺瘤
 - C. 腺淋巴瘤
 - D. 基底细胞腺瘤
 - E. 嗜酸细胞腺瘤
88. 患者缺失一前牙，其它牙有散在间隙，最好的处理为
- A. 修复缺失牙
 - B. 修复缺失牙并用光敏修复间隙
 - C. 烤瓷冠
 - D. 拔除有间隙的牙
 - E. 先正畸关闭或集中间隙后再修复
89. 适于桩冠修复的是
- A. 18岁以下青少年
 - B. 严重根尖吸收
 - C. 前牙错位牙
 - D. 牙槽骨吸收超过根长 1/2
 - E. 根管弯曲
90. 金属烤瓷冠唇面龈边缘一般为
- A. 0.5mm 肩台
 - B. 1mm 肩台
 - C. 1.2mm 肩台
 - D. 1.5mm 肩台
 - E. 1.8mm 肩台
91. 决定基托伸展范围不必考虑
- A. 缺牙多少和部位
 - B. 基牙健康状况
 - C. 牙槽嵴吸收程度
 - D. 合力大小
 - E. 患者的要求

92. 临床上用于记录颌位关系的是
- A. 基托
 - B. 暂基托
 - C. 合堤
 - D. 合托
 - E. 蜡基托
93. “外形高点”是指
- A. 牙冠邻面相接触点
 - B. 牙冠最突出的点
 - C. 牙冠各面最高的点
 - D. 牙冠颊面最突出的部分
 - E. 牙体各轴面最突出的部分
94. 覆合、覆盖有重要的生理意义，除了
- A. 扩大咀嚼面积
 - B. 减少侧方运动时殆干扰
 - C. 有利于提高咀嚼效能
 - D. 保护唇颊侧软组织
 - E. 保护舌的边缘
95. 下颌牙齿的血供来自
- A. 舌动脉
 - B. 下唇动脉
 - C. 面动脉
 - D. 颞浅动脉
 - E. 上颌动脉
96. 一患者面部被刀砍伤后，右额纹消失，是哪一支面神经受损
- A. 颞支
 - B. 颧支
 - C. 颊支
 - D. 下颌缘支
 - E. 颈支
97. 正常的前牙覆合是指
- A. 上前牙盖过下前牙的唇面小于 $\frac{1}{2}$
 - B. 上前牙盖过下前牙的唇面小于 $\frac{2}{3}$
 - C. 上前牙不能完全盖过下前牙的唇面
 - D. 上前牙与下前牙的切缘相对
 - E. 上前牙盖过下前牙的切 $\frac{1}{3}$ 之内

98. 下牙槽神经阻滞麻醉的主要标志为
- A. 口腔前庭沟
 - B. 下后牙咬合平面
 - C. 颊脂垫尖
 - D. 翼下颌韧带
 - E. 腮腺导管开口
99. 关于口腔鳞癌，以下哪项是错误的
- A. 是口腔最常见的恶性肿瘤
 - B. 男性多于女性
 - C. 以口底鳞癌最多
 - D. 血道转移较少见
 - E. 口腔后部鳞癌较易转移
100. 牙本质的形成始于
- A. 帽状晚期
 - B. 帽状早期
 - C. 钟状晚期
 - D. 钟状早期
 - E. 牙板形成期
101. 牙髓电活力测验时，测器电极应放的位置
- A. 咬合面中部
 - B. 牙颈部
 - C. 龋坏部周围
 - D. 牙尖部
 - E. 唇（颊）面中 $\frac{1}{3}$ 处
102. 以下哪组病理特征可用于鉴别扁平苔藓和慢性盘状红斑狼疮
- A. 上皮表面过度角化，可发生糜烂或溃疡
 - B. 基底细胞发生液化变性，基底膜不清晰
 - C. 棘层萎缩变薄，上皮钉突伸长
 - D. 可见角质栓塞，血管周有淋巴细胞浸润
 - E. 上皮与固有层之间可形成裂隙和小水疱
103. 成釉细胞瘤有以下临床表现，除了
- A. 男性患者占绝大多数
 - B. 渐进性颌骨膨大
 - C. 按之有乒乓感
 - D. X线可为单囊或多囊性投射影
 - E. 肿瘤区牙齿移位、松动

104. 对牙髓刺激作用最大的充填材料是

- A. 复合体
- B. 复合树脂
- C. 银汞合金
- D. 磷酸锌水门汀
- E. 玻璃离子水门汀

105. 牙髓温度测验结果表示, 错误的是

- A. 正常
- B. (一)
- C. 敏感
- D. 迟钝
- E. 无反应

三、问答题 (总分 60 分, 每题 10 分)

1. 试述影响种植体骨结合的因素。
2. 牙周翻瓣术的适应证。
3. 髁状突骨折的治疗原则。
4. 固定桥试戴中的常见问题及处理。
5. 深覆合患者上前牙缺失的可摘局部义齿修复原则。
6. 列表说明急性根尖周脓肿与急性牙周脓肿的鉴别要点。