

宁波大学 2019 年博士研究生招生考试初试试题(B 卷)

(答案必须写在考点提供的答题纸上)

科目代码: 3828 总分值: 100 科目名称: 精神卫生与精神病学

- C 强迫症, 怀疑、穷思竭虑
D 疑病症, 罹患不治之症
E 恐惧症, 认为某些实际无危险的环境有危险
- 6 脑内多巴胺传递主要有 4 条通路, 与精神分裂症关系密切的是 ()
A 黑质纹状体和中脑边缘系统通路
B 中脑边缘系统和漏斗结节通路
C 黑质纹状体和中脑皮层通路
D 中脑皮层和漏斗结节通路
E 中脑边缘系统和中脑皮层通路
- 7 男, 40 岁, 极度自私自利, 常说“人不为己, 天诛地灭, 人都是自私的”, 这属于心理防御机制中的 ()
A 投射 B 置换 C 升华 D 合理化 E 认同
8. 根据 2015 年的中国精神卫生调查, 精神分裂症及其他精神病性障碍加权后的终生患病率为 ()
A 5.59% B 5.88% C 6.13% D 7.46% E 7.57%
9. 关于 DSM-5, 下列说法错误的是 ()
A 取消精神分裂症亚型 B 摒弃了多轴诊断系统
C 按照“发育及生命周期”排序 D 与 ICD-11 分类基本一致
E 将拔毛障碍划归冲动控制障碍
10. 根据 DSM-5 和 ICD-10, 智商 35-49, 其严重程度为 ()
A 轻度 B 边缘 C 中度 D 重度 E 极重度
- 11 有关 ADHD, 说法错误的是 ()
A 患病率一般为 3-5% B 男女比例 (4-9) :1
C 可乐定对冲动和多动有效 D 托莫西汀是一种中枢兴奋剂
E 一般学前出现, 9 岁时明显
12. 有关 I 型和 II 型分裂症, 说法正确的是 ()
A I 型以阴性症状为主 B II 型对神经阻滞剂反应较好
C I 型认知功能无明显改变 D II 型生物学基础为多巴胺功能亢进
E I 型预后较差
- 13 新版中国精神分裂症防治指南: 首发患者维持治疗时间至少 ()
A 6 月 B 1 年 C 1-2 年 D 3 年 E 2-5 年

宁波大学 2019 年博士研究生招生考试初试试题(B 卷)

(答案必须写在考点提供的答题纸上)

科目代码: 3828 总分值: 100 科目名称: 精神卫生与精神病学

- 14 锂盐中毒的早期表现是 ()
A 发热、定向障碍 B 震颤、共济失调 C 恶心等胃肠道反应
D 吞咽困难 E 下肢水肿
- 15 躁狂发作睡眠障碍的特点 ()
A 入睡困难 B 多梦 C 早醒 D 易醒 E 睡眠需要减少
- 16 有关抑郁障碍, 说法错误的是 ()
A 多数为急性或亚急性起病 B 男女比例约 2:1
C 50%患者疾病发生后 2 年内复发 D 皮质醇可引起抑郁症状
E 老年抑郁的躯体症状较为少见
- 17 根据 2015 年中国双相障碍防治指南, 双相障碍 II 型抑郁发作急性期, 首选药物是 ()
A 碳酸锂 B 锂盐+SSRIs C 氟西汀+奥氮平 D 拉莫三嗪 E 喹硫平
- 18 神经性厌食, 错误的是 ()
A 可有消化性溃疡 B 女性可闭经 C 可出现心动过缓
D 部分患者出现低血糖 E DSM-5 提出, BMI \leq 17.5 为诊断标准
- 19 重度阻塞性睡眠呼吸暂停是指 ()
A AHI $>$ 15 B AHI $>$ 20 C AHI $>$ 25 D AHI $>$ 30 E AHI $>$ 35
- 20 关于阻塞性睡眠呼吸暂停, 错误的是 ()
A 根据临床症状和检查结果决定是否需要治疗
B 血红蛋白氧饱和度下降超过 10%, 需考虑治疗
C 单纯性打鼾, 如存在睡眠片段化和日间嗜睡, 可暂观察
D CPAP 安全有效
E 咽部手术对中重度患者效果欠佳
- 21 不属于性功能障碍的是 ()
A 延迟射精 B 恋物症 C 勃起障碍 D 性欲低下 E 早泄
- 22 阿片类药物急性中毒的症状不包括 ()
A 呼吸抑制 B 意识障碍 C 瞳孔扩大 D 低血压 E 精神状态改变
- 23 关于酒精及酒精依赖, 错误的是 ()
A 酒精首先抑制皮层, 最后为脑干
B 醉驾标准为血液浓度 0.08%
C 急性醉酒首先损害前额叶功能

宁波大学 2019 年博士研究生招生考试初试试题(B 卷)

(答案必须写在考点提供的答题纸上)

科目代码: 3828 总分值: 100 科目名称: 精神卫生与精神病学

D 酒精肝脏代谢最主要的是过氧化酶和 P450 酶

E 震颤谵妄首选地西洋

24 隐袭起病, 进行性加重的行为、人格改变, 语言障碍, 记忆、视空间症状不明显, 首先考虑 ()

A 阿尔茨海默病 B 血管性痴呆 C 路易体痴呆 D 额颞叶痴呆 E 帕金森病认知障碍

25 根据 ICD-10, 诊断广泛性焦虑障碍的病程至少 ()

A 1 月 B 3 月 C 6 月 D 1 年 E 2 年

26 关于强迫障碍, 最有效的心理治疗是 ()

A 暴露和反应预防 B 支持性心理治疗 C 精神分析疗法

D 森田疗法 E 家庭治疗

27 美国 9.11 恐怖袭击后 1-2 月, 幸存者反复梦中出现袭击相关的噩梦, 避免讨论类似事件, 警觉性增高, 首先考虑 ()

A 焦虑障碍 B 恐惧症 C 创伤后应激障碍 D 抑郁症 E 急性应激障碍

28 根据 DSM-5, 躯体症状障碍的病程至少 ()

A 1 月 B 8 周 C 3 月 D 6 月 E 2 年

29 氯氮平常见的不良反应, 不包括 ()

A 粒细胞缺乏 B 镇静 C 锥体外系反应 D 体重增加 E 癫痫发作

30 半衰期最长的抗抑郁药物是 ()

A 西酞普兰 B 氟伏沙明 C 帕罗西汀 D 氟西汀 E 舍曲林

三、简答题, 每题 10 分, 共 30 分

1. 简述人格障碍的特征。
2. 简述 Wernick 脑病。
3. 简述阿片类药物急性中毒症状。

四、病例分析题, 共 20 分

男, 38 岁, 自幼父母离异, 童年时耳边常有音乐回响, 为此痛苦, 未曾特殊诊治。1 月前因情绪低落至医院就诊, 予药物治疗后好转。某日, 道路偶遇一法国人, 热情洋溢的采用中式英语与之对话、眉飞色舞, 并邀请参加家庭聚会, 妻子察觉异常, 陪同复诊。应考虑哪些疾病, 请列出鉴别要点。