

# 扬州大学

## 2018年硕士研究生招生考试初试试题（ B 卷）

科目代码 308 科目名称 护理综合

满分 300

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

### 一、单项选择题（在每小题的五个备选答案中，选出一个正确答案，并将其代码填在答题纸上，每小题 1.5 分，共 90 分）

1. 患者，女性，78岁，慢性阻塞性肺病急性加重收住入院，查动脉血气分析： $\text{PaO}_2$ 45mmHg， $\text{PaCO}_2$ 75mmHg。应给予的氧疗是  
A. 持续低流量、低浓度给氧      B. 持续高流量、高浓度给氧  
C. 间歇低流量、低浓度给氧      D. 间歇高流量、高浓度给氧  
E. 间歇高流量、乙醇湿化给氧
2. 左心衰竭主要表现为  
A. 肺循环淤血和心排血量降低所致的临床综合症      B. 水肿  
C. 胃肠淤血      D. 颈静脉征      E. 肝颈静脉回流征阳性
3. 患者女性，56岁。高血压病3年，今日血压急剧升高，收缩压高于200mmHg，并且出现头痛、心悸，首先考虑  
A. 高血压危象      B. 高血压脑病      C. 高血压性脑出血  
D. 急性左心衰      E. 短暂性脑缺血发作
4. 下列哪一项不是心肌梗死的并发症  
A. 胸膜炎      B. 梗死后综合征      C. 心脏破裂  
D. 室壁瘤      E. 二尖瓣脱垂
5. 患者服用胶体次枸橼酸铋（CBS），下列用药指导哪项是错误的  
A. 服药后会出现便秘      B. 部分病人可出现恶心。  
C. 指导病人直接饮用，有一过性血清转氨酶升高。  
D. 在服药过程中可出现牙齿、舌头发黑，粪便变黑。  
E. 极少数患者出现急性肾衰竭
6. 下面属于溃疡性结肠炎引起的腹泻的特点是  
A. 腹泻时的量少      B. 粪便一般呈水样      C. 粪便中含有脂肪滴  
D. 灰白色粪便      E. 粪便含有较多的黏液和脓血
7. 乙肝肝硬化失代偿期病人要限制水和钠的摄入，每天的进水量应限制在  
A. 2500ml      B. 2000ml      C. 1500ml      D. 1000ml      E. 500ml
8. 肾炎性水肿的特点不包括  
A. 多从颜面部开始      B. 重者可波及全身      C. 指压凹陷很明显  
D. 常为体位性      E. 系肾小球滤过率下降所致
9. 重型再生障碍性贫血的早期突出表现为  
A. 贫血      B. 黏膜溃疡      C. 出血与感染      D. 骨髓增生减低      E. 食欲减退

10. 甲亢病人的饮食原则是
- A. 高蛋白、高热量、高维生素饮食
  - B. 低蛋白、高热量、高维生素饮食
  - C. 低糖、低脂、高蛋白、高纤维素饮食
  - D. 低糖、低脂、低蛋白、高纤维素饮食
  - E. 高蛋白、高糖、高维生素、高钠饮食
11. 下列关于短暂性脑缺血发作的叙述, 错误的是
- A. 症状持续数分钟至数小时
  - B. 无 CT 或 MRI 显示的结构改变
  - C. 简称为 TIA
  - D. 不会反复发作
  - E. 发作后不遗留神经功能缺损症状
12. 关于脑出血的护理措施, 下列叙述错误的是
- A. 绝对卧床休息 24 小时, 此后可以慢慢活动
  - B. 各项治疗护理操作集中进行, 以减少刺激
  - C. 置病人平卧位头偏向一侧或侧卧位
  - D. 过度烦躁不安病人可遵医嘱适量应用镇静剂
  - E. 每 2 小时应协助病人变换体位一次
13. 患者女性, 22 岁。因咳嗽、痰中带血 3 日, 以“支扩”收住院。今晨突然大咳血 100ml。该患者最主要的护理诊断或合作性问题是
- A. 焦虑
  - B. 活动无耐力
  - C. 潜在的并发症: 窒息
  - D. 知识缺乏
  - E. 有感染的危险
14. 患者女性, 65 岁。慢性支气管炎病史 20 余年, 近半年来呼吸困难加重, 下肢水肿, 诊断为慢性肺心病。血气分析:  $\text{PaO}_2$  52mmHg,  $\text{PaCO}_2$  64mmHg。给患者氧疗时应采取
- A. 立即吸入高浓度氧
  - B. 低浓度、低流量间断给氧
  - C. 低浓度、低流量持续给氧
  - D. 短期给氧
  - E. 高流量给氧
15. 患者女性, 59 岁, 风心病伴二尖瓣狭窄 6 年, 伴心房颤动 5 年, 无明显原因突然出现意识障碍, 最可能的原因是
- A. 发生室颤
  - B. 心排出量减少, 脑供血不足
  - C. 心房血栓脱落, 脑栓塞
  - D. 高凝状态, 脑血栓形成
  - E. 发生房颤
16. 张先生, 45 岁, 行毕 II 式胃大部切除术后第 8 天, 突然上腹部剧痛, 呕吐频繁, 每次量少, 不含胆汁, 呕吐后症状不缓解。查体: 上腹部偏右有压痛, 考虑并发症为
- A. 吻合口梗阻
  - B. 倾倒综合征
  - C. 十二指肠残端破裂
  - D. 输入段肠袢梗阻
  - E. 输出段肠袢梗阻
17. 高渗性缺水早期出现的主要临床表现是
- A. 尿量减少
  - B. 血压下降
  - C. 烦躁
  - D. 口渴
  - E. 神志不清
18. 男性, 34 岁, 因反复呕血、黑便 3 小时入院, 致休克, 在补液治疗中, 循环灌注改善与否的重要判断指标是
- A. 血压回升
  - B. 皮肤红润
  - C. 尿量增加
  - D. 呼吸、脉搏减慢
  - E. 肢端温暖

19. 关于牵引的护理错误的是
- A. 皮牵引病人应密切观察患肢末梢血运
  - B. 更换床单或翻身时应及时松解牵引, 以免造成疼痛
  - C. 骨牵引病人可予乙醇滴针眼, 预防感染
  - D. 牵引期间要经常纠正病人的体位, 以达到牵引的效果
  - E. 由皮牵引引起的小面积溃疡, 可按一般换药法将创面擦净, 涂以甲紫, 敷盖小纱布, 继续牵引
20. 若骨折过度牵引, 有可能造成
- A. 拉开碎骨片
  - B. 产生肌萎缩
  - C. 引起脱钙
  - D. 增加疼痛
  - E. 引起痉挛
21. 急性腹膜炎患者行腹腔穿刺检查, 下列说法错误的是
- A. 胃、十二指肠穿孔时穿刺液呈黄色, 混浊状, 无臭味
  - B. 急性化脓性腹膜炎穿刺液呈稀脓性, 有臭味
  - C. 绞窄性肠梗阻可抽出不凝固的血液, 臭味重
  - D. 如是血性渗出液, 且淀粉酶含量高, 提示坏死性胰腺炎的可能
  - E. 如抽出不凝固的血液, 说明有腹内实质脏器破裂
22. 赵女士, 35岁, 腹部被车撞伤2天, 由当地卫生院转来医院。腹痛, 恶心呕吐, 发热, 尿少,  $T38.8^{\circ}\text{C}$ ,  $\text{BP } 80/60\text{mmHg}$ ,  $\text{P } 120$ 次/分, 腹胀, 全腹压痛及反跳痛, 右下腹最明显, 伴肌紧张, 移动性浊音(+). 该病人目前的护理措施错误的是
- A. 静脉输液
  - B. 半卧位
  - C. 做好术前准备
  - D. 心理支持
  - E. 禁食、胃肠减压
23. 女性, 67岁, 自诉洗澡时偶然发现右乳内一个无痛性肿块来院就诊, 被诊断为乳腺癌。今日行乳腺癌改良根治术, 手术顺利, 安返病房。平卧休息时该病人右臂应
- A. 尽量向外展
  - B. 自然垂于床边
  - C. 在身旁垫枕抬高
  - D. 屈肘 $90^{\circ}$ 放于胸腹部
  - E. 随意放在舒适的位置
24. 男性, 18岁。因车祸致头部受伤, 伤后当即昏迷1小时, 清醒后诉头痛, 有呕吐, 右上肢肌力II级; 脑脊液检查有红细胞; CT扫描见左额顶叶低密度灶, 其中有散在点高密度影。目前病人病情观察的重点在于
- A. 呼吸道梗阻
  - B. 颅内压增高
  - C. 压疮
  - D. 水电解质失衡
  - E. 感染
25. 动脉硬化闭塞症早期最主要的临床表现是
- A. 患肢趾(指)端发黑、干瘪
  - B. 患肢发生坏疽、溃疡
  - C. 患肢皮肤出现潮红
  - D. 患肢麻木、发凉, 轻度间歇性跛行
  - E. 患肢持续剧烈性疼痛
26. 男性, 47岁, 右胸被马车撞伤, 呼吸困难。右前胸壁有部分软化区, 且随呼吸运动波动。首先应采取的急救措施是
- A. 胸壁软化区加压包扎
  - B. 气管切开给辅助呼吸
  - C. 应用止痛药物
  - D. 胸腔穿刺排气减压
  - E. 开胸手术
27. 关于肾癌病人行患侧肾脏全切除术的术后护理错误的是
- A. 卧床1周以上
  - B. 麻醉复苏, 血压平稳后可进食少量流质
  - C. 保持伤口引流管通畅
  - D. 饮水, 保持尿量
  - E. 术后72小时鼓励患者起床活动
28. 女性, 60岁, 体重50kg。因胆石症急性发作, 呕吐多次, 目前生命体征平稳, 尚无明

- 显缺水征象。目前最确切的护理诊断是
- A. 体液不足                      B. 组织灌注量改变                      C. 有体液不足的危险  
D. 焦虑                              E. 心输出量减少
29. 符合休克代偿期临床表现的特点的是
- A. 血压下降, 脉压显著缩小, 心率加快, 尿量减少  
B. 血压下降, 脉压轻度缩小, 心率加快, 尿量减少  
C. 血压正常, 脉压无变化, 心率加快, 尿量正常  
D. 血压轻度降低, 脉压无变化, 心率加快, 尿量减少  
E. 血压正常或稍升高, 脉压缩小, 心率加快, 尿量正常或减少
30. 张女士, 55岁, 胰十二指肠术后, 经空肠造口管行肠内营养3天, 病人出现发热、腹痛, 腹部压痛、反跳痛、肌紧张。有助于判断为饲管移位造成急性腹膜炎的征象是
- A. 开始发热的时间和严重程度                      B. 腹痛的部位、范围和性状  
C. 腹腔引流管引流出营养液类似液体                      D. 胃肠减压管引流液的量和性状  
E. 有无休克等全身反应
31. 王小姐, 58岁, 因病情需要行气管切开, 考虑其病房环境时应特别注意
- A. 保持适宜的温度                      B. 创造安静的环境  
C. 定时通风                              D. 合理采光  
E. 保持适宜的湿度
32. 烧伤病区属于B类环境, 要求空气中的菌落总数不超过
- A.  $10\text{cfu}/\text{m}^3$                               B.  $50\text{cfu}/\text{m}^3$   
C.  $100\text{cfu}/\text{m}^3$                               D.  $200\text{cfu}/\text{m}^3$   
E.  $500\text{cfu}/\text{m}^3$
33. 过氧乙酸不能用于
- A. 手的消毒                              B. 空气消毒  
C. 浸泡金属器械                              D. 擦拭家具  
E. 浸泡搪瓷类物品
34. 王护士, 在给HIV阳性患者采血后被污染的针头扎伤, 她立即按操作规程处理了伤口, 还应该按照规定检查HIV抗体的时间, 除外
- A. 当天                      B. 4周                      C. 8周                      D. 6个月                      E. 16个月
35. 患者史某, 女, 50岁。持续昏迷, 护士观察到其痰液黏稠致呼吸困难, 下列处理不妥的是
- A. 氧气吸入                              B. 用力叩击胸壁脊柱, 以利排痰  
C. 必要时用吸引器吸痰                              D. 帮助患者多翻身  
E. 超声雾化吸入
36. 女, 38岁, 急性阑尾炎术后2h, 意识清醒, 主诉畏寒,  $T35.9^{\circ}\text{C}$ 。护士为其加盖被服并在足底放置化学加热袋。使用化学加热袋时, 最高温度可达
- A.  $46^{\circ}\text{C}$                       B.  $56^{\circ}\text{C}$                       C.  $66^{\circ}\text{C}$                       D.  $76^{\circ}\text{C}$                       E.  $86^{\circ}\text{C}$
37. 陈某, 女, 61岁。因经常便后出血, 经检查患有痔疮, 行痔疮手术。术后医嘱热水坐浴。以下热水坐浴措施中, 错误的是
- A. 浴盆和溶液须无菌                              B. 操作前需排空膀胱  
C. 水温控制在 $50^{\circ}\text{C}$ 左右                              D. 坐浴后更换敷料  
E. 坐浴时间15~20min
38. 为阿米巴痢疾患者做保留灌肠时, 采取右侧卧位的目的是
- A. 减轻药物的毒副作用                              B. 有利于药液保留

- C. 可提高治疗的效果  
D. 减少对患者的刺激  
E. 使患者达到舒适、安全
39. 氧气雾化吸入时, 氧流量应调至  
A. 0.5L/min B. 1~2L/min C. 2~4L/min D. 6~8L/min E. 8~10L/min
40. 郭某, 因肺结核注射链霉素, 出现了发热、皮疹、荨麻疹, 医嘱静脉注射葡萄糖酸钙, 其目的是  
A. 收缩血管, 增加外周阻力 B. 松弛支气管平滑肌  
C. 减轻毒性症状 D. 降低体温  
E. 缓解皮肤痛痒
41. 下列关于输血发生溶血反应时的处理措施, 错误的是  
A. 立即停止输血 B. 静脉滴注碳酸氢钠  
C. 双侧腰封或肾区热敷 D. 肾衰竭者多饮水以排除毒素  
E. 将剩余血送检, 重做血型鉴定和交叉配血试验
42. 输入下列哪种药液时速度宜慢  
A. 低分子右旋糖酐 B. 5%葡萄糖溶液  
C. 升压药 D. 抗生素  
E. 甘露醇
43. 下列关于小儿头皮静脉输液的方法错误的选项是  
A. 剃去局部头发 B. 70%酒精消毒局部  
C. 右手持针沿静脉向心方向刺入 D. 见回血后, 用胶布固定针头  
E. 调节滴速, 一般 40~60 滴 / 分
44. 测定尿钾、钠、氯、肌酐时, 尿中加入的防腐剂是  
A. 甲苯 B. 甲醛  
C. 浓盐酸 D. 稀盐酸  
E. 95%乙醇
45. 患者, 刘某, 肝癌末期疼痛, 护士给该患者镇痛治疗, 需要对其疼痛治疗前后效果测定对比, 最适宜的评估方法是  
A. 面部表情疼痛评定法 B. 文字描述评定法  
C. 数字评分法 D. 视觉模拟评分法  
E. Prince-Henry 评分法
46. 患者, 女性, 误食灭鼠药 (磷化锌) 中毒, 被送入急诊室, 此时为患者洗胃最好选用  
A. 温开水 B. 生理盐水  
C. 2%碳酸氢钠 D. 1: 15000~1: 20000 高锰酸钾液  
E. 4%碳酸氢钠
47. 对临终患者临床表现的叙述不正确的是  
A. 肌肉张力丧失 B. 血压下降, 脉搏细弱  
C. 潮式呼吸或点头样呼吸 D. 胃肠蠕动加快而腹胀  
E. 各种深浅反射逐渐消失
48. 下列有关医嘱种类不正确的描述是  
A. 临时备用医嘱有效时间在 24 h 以内  
B. 长期医嘱在医生注明停止时间以后失效  
C. 长期备用医嘱须由医生注明停止日期后失效  
D. 长期医嘱有效时间在 24 h 以上  
E. 临时医嘱有效时间在 24 h 以内



57. 人们在车祸发生后进行的自救, 属于
- A. 求医行为
  - B. 遵医行为
  - C. 预警行为
  - D. 保健行为
  - E. 避免有害环境行为
58. 关于下列姑息护理的内容错误的是
- A. 消除痛苦和其他症状
  - B. 既不加速也不延迟死亡
  - C. 针对任何阶段疾病的病人
  - D. 在机构进行
  - E. 必要时用团队的方法帮助病人和家属
59. 一级预防措施不包括
- A. 教育人民养成健康的生活习惯
  - B. 提供安全饮水
  - C. 提供安全的居住环境
  - D. 指导妇女自我检查乳房以早期发现乳癌
  - E. 教育人民养成健康的生活习惯
60. 根据 Sunrise model 下列说法正确的是
- A. 护理关怀为亚层次
  - B. 描述了文化关怀、文化社会结构、世界观和人生观的构成
  - C. 分为三层
  - D. 最外层是护士提供文化相适应的护理程序
  - E. “人类无法与其所处的文化背景和社会环境相分离”是 Madeleine Leininger 文化理论的核心思想

**二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中，选出二个至五个正确答案，并将其代码分别填在答题纸上，多选、少选、错选均不得分，每小题 2 分，共 60 分）**

1. 胸腔闭式引流期间，如何保证有效的引流
- A. 病人搬动时，用两把血管钳将引流管夹紧
  - B. 引流管内的水柱随呼吸上下波动
  - C. 引流管装置安全摆放
  - D. 引流液黏稠时，应根据病情定时捏挤引流管
  - E. 引流瓶其液平面低于引流管胸腔出口平面 40mm
2. 心肌梗死与心绞痛病人胸痛的主要区别
- A. 胸痛的程度
  - B. 胸痛的放射性
  - C. 胸痛的时间
  - D. 胸痛的诱因
  - E. 胸痛的部位
3. 心律失常病人常见的护理问题有哪些
- A. 活动无耐力
  - B. 有受伤的危险
  - C. 焦虑

- D. 体温过高 E. 清理呼吸道无效
4. 有关呕血与黑粪的讨论观点正确的是
- A. 有黑粪不一定有呕血 B. 呕血常伴黑粪
- C. 呕血呈咖啡色是血液在胃内经胃酸作用形成酸性血红蛋白所致
- D. 柏油样便是血红蛋白铁与肠内硫化物作用形成硫化铁所致
- E. 幽门以上出血只表现为呕血而幽门以下出血只表现为黑粪
5. 再生障碍性贫血预防感染的措施主要有
- A. 保持病室内空气清新, 物品清洁, 定期使用消毒液擦拭室内家具、地面, 并用紫外线或臭氧照射消毒
- B. 限制探视人数及次数, 避免到人群聚集的地方或与上呼吸道感染的病人接触
- C. 督促患者养成进餐前后、睡前、晨起用漱口水交替漱口的习惯
- D. 保持皮肤清洁、干燥, 勤沐浴, 各种侵入性操作注意无菌原则
- E. 睡前、便后用 1:5000 高锰酸钾溶液坐浴, 保持大便通畅
6. 甲亢危象的诱因主要有
- A. 应激状态, 如感染、手术等 B. 口服过量的甲状腺激素制剂
- C. 严重的精神创伤 D. 手术中过度挤压
- E. 躯体严重疾病, 如败血症、严重创伤等
7. 脑疝的先兆症状有哪些
- A. 脉搏增快 B. 血压升高 C. 呼吸不规则
- D. 意识障碍加重 E. 脉搏减慢
8. 下列哪些护理措施适用于心肌梗死病人:
- A. 前 1~3 天绝对卧床休息 B. 所有病人第二周都需试着下床活动
- C. 发病第一天给予高蛋白、高热量软食 D. 少量多餐、不宜过饱
- E. 发病最初几日给予持续吸氧
9. 消化道出血病人出血量的评估, 正确的是:
- A. 出现黑便表明出血量在 50~70ml 以上
- B. 胃内积血量超过 100ml 时, 可引起呕血
- C. 一次出血量在 400ml 以下时, 一般不引起全身症状
- D. 中等量出血指出血量在 500-1000ml
- E. 大出血指出血量超过 1000ml
10. 肾病综合征病人可出现下列哪些并发症:
- A. 急性肾衰竭 B. 静脉血栓 C. 继发感染
- D. 高脂血症 E. 水肿
11. 动脉硬化闭塞症的护理措施正确的是
- A. 保持患肢清洁、干燥
- B. 术后第 2 日可下床活动, 以预防深静脉血栓形成
- C. 术后患肢安置水平位置
- D. 注意病人保暖
- E. 进食蔬菜、水果等富含纤维的食物



12. 关于腹股沟直疝的叙述正确的是  
A. 容易嵌顿 B. 多见于老年男性 C. 绝大多数为后天性的  
D. 疝块呈半球形 E. 疝囊从腹壁下动脉内侧直疝三角突出
13. 腹部损伤病人术后护理措施正确的是  
A. 禁食 B. 进行胃肠减压 C. 麻醉清醒, 血压平稳后取半卧位  
D. 记录每日流出液体量和性质, 以及变化趋势  
E. 停止胃肠减压后可恢复普食
14. 泌尿、男性生殖系肿瘤的术后护理措施正确的是  
A. 肠道代膀胱术后, 当天开放造口  
B. 肾癌根治术后, 应重点监测健侧肾功能  
C. 行肠道代膀胱手术的病人, 胃肠功能恢复后可进普食  
D. 输尿管的引流导管拔出前需做逆行造影  
E. 输尿管皮肤造口术后应注意观察皮肤乳头的颜色以防乳头缺血坏死
15. 下列关于钾代谢的说法正确的是  
A. 正常成人血清钾浓度为 3.5~5.5mmol/L  
B. 维持细胞内渗透压  
C. 多吃多排, 少吃少排, 不吃则不排  
D. 大部分经肾排出  
E. 血清钾高时对心肌有抑制作用
16. 关于关节脱位的处理原则, 正确的是  
A. 以手法复位为主  
B. 功能锻炼以主动活动为主  
C. 功能锻炼时切忌粗暴的被动活动  
D. 固定时间越长越好  
E. 一般固定 2~3 周
17. 女性, 53 岁, 乙状结肠癌, 拟明日行乙状结肠根治术, 术前护士遵医嘱为该病人行全肠道灌洗术, 以下说法错误的是  
A. 温度约为 25°C B. 灌洗液量约 3000ml 左右  
C. 灌洗速度应先慢后快 D. 灌洗全过程应控制在 2 小时内  
E. 年迈体弱, 心肾等脏器功能障碍以及肠梗阻者, 不宜选用
18. 胆道疾病病人行 B 超检查的描述, 正确的是  
A. 确诊率高 B. 安全, 无痛苦 C. 检查前不须禁食  
D. 可重复 E. 无创性
19. 男, 22 岁, 肾损伤, 非手术治疗。下列护理措施中正确的是  
A. 绝对卧床休息 B. 输液、使用止血药  
C. 按医嘱应用抗菌药 D. 血尿消失即可下床活动  
E. 观察疼痛的部位和程度
20. 下列措施, 对防止橡胶类物品粘连有效的包括  
A. 热水袋洗净后应倒挂滴水, 完全干后吹入少量空气  
B. 橡胶单晾干后应撒上滑石粉  
C. 胃管煮沸时应用纱布包裹  
D. 橡胶手套放于手套袋内保管  
E. 橡胶圈用布包好后保管
21. 关于活动意义的描述, 正确的是

- A. 保持良好的肌张力  
B. 增强运动系统协调性  
C. 控制体重  
D. 促进睡眠  
E. 减慢老化过程
22. 患者吸气时产生一种极高的似蝉鸣样音响，可见于下列哪些疾病  
A. 喉头异物  
B. 胸腔积液  
C. 喉头水肿  
D. 阻塞性肺气肿  
E. 支气管哮喘
23. 低蛋白饮食适用的范围包括  
A. 肾病综合征患者  
B. 肥胖症患者  
C. 急性肾炎  
D. 肝硬化  
E. 尿毒症
24. 灌肠时尊重、保护患者的做法是  
A. 耐心解释，取得合作  
B. 少暴露患者，避免受凉  
C. 注意环境隐蔽  
D. 患者主诉不适时应停止操作  
E. 操作结束应谢谢患者合作
25. 下列说法正确的是  
A. 集尿袋每周更换一次  
B. 倾倒尿液时，集尿袋低于耻骨联合  
C. 引流管勿受压、扭曲  
D. 导尿管每日更换一次  
E. 患者离开床位开始活动时拔除尿管
26. 输液微粒的来源是  
A. 药物制作时混入异物与微粒  
B. 盛装药物的容器不洁净  
C. 输液容器与注射器不洁净  
D. 输液环境不洁净  
E. 加药时反复穿刺橡胶塞而致其撕裂
27. 洗胃的适应证是  
A. 有机磷农药中毒  
B. 安眠药中毒  
C. 生物碱中毒  
D. 重金属类中毒  
E. 食物中毒
28. 书写病区报告的要求包括  
A. 书写内容应真实、全面  
B. 查阅病历，记录患者的病情  
C. 应在经常巡视和了解患者病情的基础上书写  
D. 书写要简明扼要、重点突出  
E. 字迹清楚，不得随意涂改
29. 关于科尔卡巴的舒适理论错误的是  
A. 舒适有三种类型  
B. 舒适有四种情境  
C. 是一个中域型护理理论  
D. 不包括环境方面的情境  
E. 放松感属于舒适理论的情境部分
30. 患儿，男，5岁。低钙抽搐需用钙剂治疗。护士从固定位置取出10%葡萄糖酸钙，凭经验不会错而未查对药物，该患儿接受静脉推注中死亡，经过查实推注的是10%氯化钾。此行为不属于  
A. 侵权行为  
B. 故意犯罪  
C. 过失犯罪  
D. 侵犯行为  
E. 渎职罪

**三、病例分析题（将答案填写在答题纸上，每题 25 分，共 150 分）**

1. 患者，女，56岁，因进食大量鱼肉后出现反应迟钝、精神恍惚，胡言乱语、定向力障碍，拟“肝性脑病”入院，既往肝硬化病史5年，高血压病史10年；有“消化道出血”及“脾切除加门体静脉断流术”病史；护理评估：T36.3℃，P76次/分，R18次/分，Bp140/70mmHg；腹部膨隆，移动性浊音可疑阳性，肠鸣音5次/分。患者处于嗜睡状态，呼之能应，反应迟钝，不能正确对答，扑翼样震颤阳性。试问：

- (1) 肝性脑病的诱因有哪些？
- (2) 医嘱予以灌肠其目的是什么？一般选用什么溶液灌肠？
- (3) 该病人最主要的护理问题是什么？针对最主要护理问题应采取哪些护理措施？

2. 患者，男性，78岁，初中文化，退休工人，有吸烟史30年。12年前冬季首次出现咳嗽、咳痰。两年前因咳嗽、咳痰、气促加重，并出现神志模糊收入院，经无创呼吸机辅助通气、解痉平喘、抗炎、利尿等处理，病情好转后出院，出院后患者坚持家庭氧疗，并长期使用噻托溴铵（思力华）吸入剂，病情控制较好。3天前因受凉后咳嗽，咳痰加重，为黄脓痰，不易咳出，伴呼吸费力，气促加重，以“慢性阻塞性肺疾病急性加重期”收入院。

入院体检：T 38.4℃，P 100次/分，R 26次/分，BP 120/75mmHg。

神志恍惚，口唇发绀，球结膜水肿，颈软，气管居中，桶状胸，两肺语颤减弱，叩诊呈过清音，听诊双肺底可闻及散在干、湿啰音，动脉血气分析结果示：PaO<sub>2</sub>50mmHg，PaCO<sub>2</sub>76mmHg,PH7.35，血常规检查：WBC 14×10<sup>9</sup>/L，肺功能检查提示：FEV<sub>1</sub>/FVC65%。

- (1) 该患者目前的护理诊断有哪些？
- (2) 患者病情进一步加重，医疗诊断为肺性脑病，可采取哪些护理措施？
- (3) 家庭氧疗的注意事项有哪些？

3. 男性，30岁，12小时前骑自行车不慎摔倒，当即感到右小腿疼痛剧烈，移动肢体时疼痛加重。检查：右小腿肿胀明显，肢体畸形，压痛明显，活动受限。X线检查显示右胫、腓骨中段骨折。经闭合复位后右小腿管型石膏固定。目前患肢肿胀严重。

请分析：

- (1) 如何对该病人进行病情观察？
- (2) 石膏固定期间如何指导病人进行功能锻炼？
- (3) 石膏拆除前后有哪些注意事项？

4. 男性，45岁。头痛8个月，多出现于清晨及晚间，用力时加重，常伴有恶心，偶有呕吐。经CT检查诊断为颅内占位性病变、颅内压增高，入院等待手术治疗。入院后第3天，因便秘用力排便时，突然出现剧烈头痛、呕吐，随即意识丧失。体检：P56次/分，R16次/分，BP150/88mmHg。左侧瞳孔散大，对光反应消失；右侧肢体瘫痪，病理征阳性。

请分析：

- (1) 入院后第3天，病人发生何种并发症？为什么？
- (2) 目前的急救护理措施有哪些？

5. 患者，女，60岁，主诉：3年来，在劳动或爬楼后常感心悸、呼吸困难。现病史：因反复咳嗽、咳痰11年，伴气促、心悸3年，下肢水肿2年入院。11年前感冒后发热、咳嗽、咳脓痰。以后每逢冬春季常咳嗽、咳白色泡沫痰，有时为脓痰，反复加重。3月前受凉后发热，咳嗽加重，咳脓痰，心悸气促加剧不能平卧，急诊入院。既往史：大叶性肺炎，否认高血压，糖尿病史。查体：T：39.4℃。P：98次/分，R：28次/分。BP：104/79mmHg。背部或双肺底听到干、湿性啰音，咳嗽后可减少或消失，可闻及广泛哮鸣音并伴呼气期延长。

请分析：

- (1) 该病人的发热程度如何？
- (2) 本病人的主要护理诊断是什么(按顺序排列三个)？
- (3) 主要护理措施有哪些？

6. 患者，男，73岁，阻塞性肺气肿18年，感冒后病情加重住院治疗。静脉输液过程中呼吸困难加重，出现端坐呼吸，咳粉红色泡沫样痰，听诊两肺满布湿啰音，心律失常。

请分析：

- (1) 患者目前处于何种状态？如何预防？
- (2) 护士应采取哪些紧急措施进行护理？