暨南大學
JINAN UNIVERSITY

2022年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题（B卷）

****

招生专业与代码：护理/护理学
105400/101100

考试科目名称及代码：护理综合 308

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、单项选择题（下列每道题有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最合适的答案写在答题纸上，共40题，每题1.5分，共60分）

1. 一名空巢老人，患急性化脓性阑尾炎入院，他首先需要满足的是（　　）
   A. 生理需要
   B. 安全的需要
   C. 自尊的需要
   D. 爱与归属的需要
   E. 自我实现的需要
2. 在护理诊断陈述中，营养失调：P 低于机体需要量，S 极度消瘦恶病质，E 与进食少或不能进食、消耗增加等有关。“S”表示的含义是（　　）
   A. 健康问题
   B. 病因或相关因素
   C. 症状和体征
   D. 实验室检查
   E. 临床表现
3. 患儿，男，10个月，足月顺产，因腹泻住院治疗。其母亲诉说患儿是人工喂养，胃口不好、经常哭闹。根据弗洛伊德的理论，该患儿此期属于（　　）
   A. 婴儿期
   B. 幼儿期
   C. 口欲期
   D. 肛欲期
   E. 潜伏期
4. 护士根据患者病情，针对性地给予护理措施，属于评判性思维的（　　）
   A. 基础层次
   B. 简单层次
   C. 复杂层次
   D. 尽职层次
   E. 高阶层次
5. 根据艾瑞克森的心理社会发展理论，幼儿期发展的主要危机是（　　）
   A. 信任对不信任
   B. 主动性对内疚
   C. 自主对羞怯或疑虑
   D. 自我认同对角色紊乱
   E. 勤奋对自卑

6. 患者张某对责任护士说："我伤口很痛，是不是感染了？"属于（　　）

A. 一般性沟通

B. 事务性沟通

C. 分享性沟通

D. 情感性沟通

E. 共鸣性沟通

7. 根据纽曼系统模式，下面属于二级预防内容的是（　　）

A. 新冠肺炎疫情期间少去人多的公共场合

B. 健康促进和健康维护

C. 减轻或消除压力反应的症状

D. 早期发现、早期治疗

E. 加强功能锻炼，帮助个体恢复健康，防止复发

8. 患者陈某，男，65 岁，长期卧床，自理困难，最近护理时发现骶尾部皮肤红，除去压力无法恢复原来肤色，属于压疮的（　　）

A. 炎性浸润期

B. 淤血红润期

C. 浅度溃疡期

D. 深度溃疡期

E. 局部皮肤感染

9. 代谢性酸中毒患者的呼吸表现为（　　）

A. 间断呼吸

B. 呼吸深而快

C. 叹息样呼吸

D. 蝉鸣样呼吸

E. 无声呼吸

10. 腰麻后 6h 内去枕平卧的目的是（　　）

A. 防止脑部缺血

B. 防止脑部缺氧

C. 促进血压上升

D. 防止颅内压降低

E. 促进血压下降

11. 适用于内镜消毒的消毒剂是（　　）

A. 过氧乙酸

B. 戊二醛

C. 环氧乙烷

D. 乙醇

E. 聚维酮碘（碘伏）

12. 以下不属于医院感染的是（　　）

A. 新生儿肺炎

B. 新生儿脐炎

C. 新生儿腹泻

D. 新生儿败血症

E. 新生儿硬肿症

13. 肠套叠病儿的大便呈（　　）

A. 果酱样
B. 陶土色
C. 金黄色
D. 黑色
E. 栗子样便

14. 青霉素过敏试验后，如发生过敏性休克，最早出现的症状通常是（　　）
A. 循环衰竭症状
B. 中枢神经系统症状
C. 呼吸系统症状
D. 泌尿系统症状
E. 消化系统症状

15. 护士经股静脉采血时，其穿刺部位是（　　）
A. 股动脉内侧 0.5cm
B. 股动脉外侧 0.3cm
C. 股神经内侧 0.3cm
D. 股神经外侧 0.5cm
E. 股动脉与股神经之间

16. 为尿潴留患者第一次放尿，放尿量不应超过（　　）
A. 400ml
B. 500ml
C. 800ml
D. 1000ml
E. 1500ml

17. 患者张某，男，50 岁，有吸烟病史 30 年，全麻下行甲状腺次全切除术后，已拔除气管插管，患者意识模糊，目前最主要的护理是（　　）
A. 约束肢体活动
B. 保持呼吸道通畅
C. 防止输液针头脱出
D. 监测生命体征
E. 保暖

18. 患者，男，40 岁，大面积烧伤后 6 小时入院。患者心率 130 次/分，血压 75/50 mmHg，尿少，发生上述情况最可能的原因是（　　）
A. 创面细菌感染造成感染性休克
B. 大量红细胞丧失造成肺换气功能障碍
C. 疼痛导致的生理反应
D. 大量水分蒸发造成脱水
E. 大量体液从血管内渗出引起低血容量性休克

19. 患者肾移植术后 10 天，出现发热，血压升高，情绪异常，尿少，血肌酐增高，尿内有蛋白，属于（　　）
A. 慢性排斥反应
B. 急性排斥反应
C. 超急排斥反应
D. 正常手术感染
E. 局部感染

20. 患者李某，男，40 岁，急性右上腹阵发性绞痛，伴寒战、高热、黄疸，急诊行胆囊切除、胆总管探查、T 管引流术，术后观察患者排便情况的最主要目的是（　　）

A. 判断患者术后饮食恢复是否合适

B. 判断患者胆总管通畅情况

C. 及时发现患者有无胃肠道出血

D. 判断患者肠道功能恢复情况

E. 判断患者对脂肪消化和吸收的能力

21. 急性化脓性腹膜炎治疗原则中最重要的是（　　）

A. 解除腹痛

B. 禁食、胃肠减压

C. 消除引起腹膜炎的病因

D. 引流、排出脓性渗出物

E. 减轻中毒症状

22. 患者王某，女，40 岁，门静脉高压症，行脾切除术后 3 天，出现腹痛、腹胀、血便，体温 38.5℃，应首先考虑（　　）

A. 盆腔脓肿

B. 腹膜炎

C. 肠系膜静脉血栓形成

D. 阑尾炎

E. 肠间脓肿

23. 肺癌患者手术治疗期间，下列护理措施不正确的是（　　）

A. 术前留取痰液送细胞学检查

B. 指导胸式呼吸和有效咳嗽

C. 术后观察有无皮下气肿和气官移位

D. 术后常规给氧

E. 术后指导肩臂功能锻炼

24. 患者李某，男，30 岁，不慎从高处摔下，诊断为尿道损伤。下列处理错误的是（　　）

A. 尿外渗处，应做切开引流

B. 引流尿液，解除尿潴留

C. 恢复尿道连续性

D. 常规应用抗生素

E. 用气囊导管压迫止血

25. 患者刘某，男，45 岁，因门静脉高压症进行脾肾分流术，出院时，进行预防上消化道出血的健康指导，下列哪项最重要（　　）

A. 服用护肝药物

B. 经常服用维生素 K

C. 少吃脂肪和蛋白质类食物

D. 饮食细软，不太热

E. 继续卧床休息

26. 患者王某，女，20 岁，因车祸致颅脑损伤，唤之睁眼，回答问题错误，躲避刺痛，其格拉斯哥昏迷计分为（　　）

A. 15 分

B. 12 分

C. 11 分

D. 8 分
E. 5 分
27. 帕金森病患者常见的步态是（　　）
A. 共济失调
B. 偏瘫步态
C. 慌张步态
D. 蹒跚步态
E. 跨域步态
28. 支气管哮喘长期反复发作，最常见的并发症是（　　）
A. 上呼吸道感染
B. 肺结核
C. 阻塞性肺气肿
D. 肺不张
E. 自发性气胸
29. 判断 COPD 气流受限的主要客观检查指标是（　　）
A. 肺功能检查
B. 影像学检查
C. 动脉血气分析
D. 血常规
E. 痰细菌学检查
30. 洋地黄制剂治疗心力衰竭最主要的机制是（　　）
A. 增强心肌收缩力
B. 兴奋交感神经
C. 扩张冠状动脉
D. 抑制迷走神经系统
E. 兴奋心脏传导系统
31. 肝炎患者眼结膜黄染的原因是（　　）
A. 血中胆固醇太多
B. 血中二氧化碳太多
C. 血中氧含量太少
D. 血中胆红素太多
E. 红细胞破坏太多
32. 慢性浅表性胃炎的最主要病因是（　　）
A. 大肠埃希菌感染
B. 金黄色葡萄球菌感染
C. 幽门螺杆菌感染
D. 沙门杆菌感染
E. 嗜盐菌感染
33. 肝硬化腹水产生的机制为（　　）
A. 脾功能亢进
B. 血浆白蛋白增多
C. 门静脉压力增高
D. 醛固酮分泌减少
E. 肾小球滤过增加

34. 患者女，36 岁，已诊断肾病综合征，近 2 天右下肢疼痛、发凉，右足背动脉搏动不清，趾皮肤发绀，应首先考虑的并发症是（　　）

A. 下尿路感染

B. 右下肢静脉血栓

C. 心源性休克

D. 急性肾衰竭

E. 右下肢动脉栓塞

35. 慢性淋巴细胞白血病最可能的首发症状是（　　）

A. 贫血

B. 出血

C. 感染

D. 淋巴结肿大

E. 脾大

36. 对甲状腺功能亢进症患者的饮食护理不妥的是（　　）

A. 高蛋白、高热量、高维生素

B. 禁喝浓茶、咖啡

C. 避免进食含碘丰富的食物

D. 避免进食辛辣等刺激性食物

E. 控制水分摄入

37. 患者男性，45 岁。肥胖症，伴高血压，糖耐量减低，尿皮质醇、17-羟皮质类固醇排泄量增高，但可被小剂量地塞米松所抑制。该患者的诊断可能是（　　）

A. 单纯性肥胖症

B. 甲状腺功能减退症

C. 糖尿病

D. 肾上腺皮脂腺瘤

E. 库欣综合征

38. 患者女，30 岁，近 2 个月中度发热，全身肌痛，四肢关节肿痛，口腔溃疡。尿常规：红细胞+，蛋白++。为缓解病情，首选的药物是（　　）

A. 抗生素

B. 糖皮质激素

C. 非甾体抗炎药

D. 镇痛药

E. 抗疟药

39. 下列传染病属于强制管理的是（　　）

A. 艾滋病

B. 出血热

C. 黑热病

D. 肺结核

E. 霍乱

40. 流行性乙型脑炎患者最主要的死亡原因是（　　）

A. 高热

B. 昏迷合并肺炎

C. 反复惊厥

D. 严重后遗症

E. 中枢性呼吸衰竭

二、多项选择题（下列每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择所有正确的答案写在答题纸上，多选或少选均不得分，共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 主动—被动型护患关系模式适用于（　　）
   A. 昏迷患者
   B. 慢性病患者
   C. 休克患者
   D. 精神患者
   E. 急性患者
2. 在奥瑞姆的自理理论中，属于一般性自理需要的有（　　）
   A. 休息
   B. 食物
   C. 适应退休生活
   D. 疾病诊断
   E. 排泄
3. 关于特级护理适用的患者人群，正确的是（　　）
   A. 严重外伤各种复杂或大手术后患者
   B. 大面积烧伤，全身感染败血症患者
   C. 车祸多脏器受损，大量失血休克患者
   D. 下肢骨折手术后患者
   E. 适用于病情危重，生命体征不稳定的患者
4. 下列患者中，应采取头高足低位的是（　　）
   A. 妊娠期胎膜早破的患者
   B. 颈椎骨折作颅骨牵引的患者
   C. 颅脑术后的患者
   D. 脑水肿的患者
   E. 跟骨或胫骨结节牵引的患者
5. 患者王某，女，56 岁，胰十二指肠切除术后 8 天，出现肠瘘，经颈内静脉行胃肠道肠外营养治疗。下列叙述正确的为（　　）
   A. 营养液从冰箱内取出后，应置室温下复温后再输注
   B. 可经中心静脉导管取血
   C. 葡萄糖、氨基酸、脂肪乳最好单独输入
   D. 营养液放置 4℃冰箱内最长 12 小时
   E. 营养液应在配制 24 小时内输完
6. 慢性肺心病急性加重期治疗的关键是（　　）
   A. 控制呼吸道感染
   B. 早期应用大剂量呼吸兴奋剂
   C. 改善心肺功能
   D. 迅速利尿、减少血容量、减轻心脏负荷
   E. 维持酸碱、水、电解质平衡
7. 预防肝癌并发上消化道出血的措施包括（　　）
   A. 发生上消化道出血，积极补充血容量
   B. 饮食以少粗纤维的饮食为主

C. 加强肝功能的监测
D. 及时纠正或控制出、凝血功能的异常
E. 绝对卧床休息

8. 下列对血栓闭塞性脉管炎患者的护理中正确的是（　　）
A. 防止外伤
B. 保暖，避免受寒
C. 局部热敷
D. 肢端坏疽应保持干燥
E. 病人休息时应保持头高脚低位

9. 对纤维胃、十二指肠镜检查的护理措施不正确是（　　）
A. 向患者仔细介绍检查患者的目的、方法、如何配合
B. 检查前 24 小时禁食
C. 检查前嘱患者取出义齿
D. 当纤维胃、十二指肠镜到达咽喉时，嘱其做吞咽动作
E. 术后嘱患者即刻饮水

10. 对传染病患者进行发热评估的内容包括（　　）
A. 热型
B. 持续时间
C. 发热过程
D. 伴随症状
E. 发热部位

三、问答题（共 4 题，每题 20 分，共计 80 分）

1. 叙述急性心肌梗死与稳定型心绞痛胸痛的异同以及急性心肌梗死的并发症。
2. 叙述血脂异常的简易分型以及此类患者的疾病预防、疾病相关知识包括饮食、运动、用药和病情监测等方面的健康指导。
3. 何为门静脉高压症？如何预防门静脉高压症患者分流术后肝性脑病的发生？
4. 叙述股骨颈骨折的临床表现及手术治疗后患者的健康教育内容。

四、病例分析题（共 5 题，共 140 分）

1. 患者男，47 岁，因胃溃疡穿孔入院。患者大专文化，已婚，是某合资企业经理，平时工作压力较大，经常熬夜，嗜好吸烟饮酒，饮食不规律，喜欢吃辣，缺乏运动。在教育子女方面夫妻有矛盾，为孩子成长问题焦虑失眠。请问：

（1）该患者的自理需要有哪些？请具体回答。（15 分）

（2）根据奥瑞姆自护理论，患者在急性期、出院前分别应该采取何种护理系统？请说明原因。（15 分）

2. 患者杨某，男，55 岁，2 小时前晨练时突发头痛、呕吐，右侧肢体活动无力，随即倒地，意识不清，急诊收入院，查体：T37.2℃，P105 次/分，R26 次/分，BP195/100mmHg，浅昏迷状态，双侧瞳孔等大，直径 2mm，光反射迟钝，角膜反射、咽反射存在，小便失禁。患者既往患有高血压 20 余年，间断服用降压药。平时性格较急躁、易怒。有烟酒嗜好 30 余年，每日吸烟 20 余支，饮白酒每日半斤余。急查头颅 CT 示左基底节区高密度影，诊断为“脑出血”。经对症治疗后遗留右侧肢体偏瘫出院。请问：

（1）脑出血有哪些临床特点？（10 分）

（2）患者入院时意识不清，如何判断是浅昏迷状态？（10 分）

（3）针对该患者如何做出院健康指导？　（10 分）

3. 患者赵某，男性，87 岁，反复咳嗽、咳痰 20 多年，气促 10 余年，多次在某医院就诊，诊断为“慢性阻塞性肺疾病”，出院后在家行家庭氧疗（每天 15h），10 天前受凉后咳嗽、咳痰、气促症状加重，不能平卧，咳黄白色粘痰，量多，不易咳出，急诊入院，入院时 T38.2℃，P105 次/分，R26 次/分，BP130/85mmHg，$SPO_2$85%，唇指轻度发绀。查动脉血气分析结果示 PH 7.30，PCO_2 10.3kpa，PO_2 8.03kpa，HCO_3^-(AB) 24.9mmol/L，SB 为 -1.3mmol/L，BB 为 -1.0mmol/L。请问：

（1）该患者入院时，主要的处理措施有哪些？（10 分）

（2）患者吸氧的浓度应为多少？为什么？（10 分）

（3）根据动脉血气分析结果判断，患者的主要并发症是什么？（5 分）

4. 患者李某，女性，68 岁，诊断“2 型糖尿病”20 年，予胰岛素注射及口服降糖药控制血糖，未规律监测血糖。近半年降糖方案为：诺和锐 30，22U，早餐前/IH；诺和锐 30，20U，晚餐前/IH；阿卡波糖片，50mg，tid/PO。10 天前发现右腹部注射胰岛素处红肿，红肿范围逐渐增大，约为 9×10cm^2，中间可见 3×4cm^2 黑色肿物，质地软，有触痛感，皮温比正常组织高，诊断“蜂窝组织炎”；患者血糖控制不佳，空腹血糖为 9～10mmol/L，餐后 2 小时血糖为 11～15mmol/L，平时较少在糖尿病专科就诊。请问：

（1）患者右腹部胰岛素注射处出现蜂窝组织炎的主要原因是什么？(10 分)

（2）胰岛素注射的部位有哪些？如何做好注射部位的轮换？（10 分）

（3）根据上述资料，请你列出患者现阶段主要健康教育内容？（10 分）

5. 患者陈某，女，35 岁，骑自行车时被汽车撞到右后腰部。患者伤后感觉右腰部疼痛较严重，持续性，伴有心悸，出汗，立即由汽车司机护送至医院。患者极度紧张，体格检查：急性病容，面色苍白，体温 36.2℃，脉搏 110 次/分，血压 90/56mmHg，右肾区饱满，压痛明显。辅助检查：血常规示血红蛋白 9.4g/L，红细胞计数下降；尿常规示镜下血尿；超声检查示右肾轮廓不清晰，肾周少量积液。临床诊断：右肾部分裂伤。目前采取非手术治疗，请问：

（1）对该患者病情观察的主要内容有哪些？（10 分）

（2）该患者目前的主要护理诊断或护理问题有哪些？请写出至少 3 个。(5 分)

（3）非手术治疗期间，对该患者的主要护理措施有哪些？（10 分）